

Taxon *Eucalyptus gunnii*

Název taxonu	<i>Eucalyptus gunnii</i>
Vědecký název taxonu	<i>Eucalyptus gunnii</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	Hook. f.
Český název	blahovičník Gunnův
Synonyma (zahradnický pou..	<i>Eucalyptus gunnii</i> var. <i>montana</i> Hook. f.; <i>Eucalyptus divaricata</i> McAulay et Brett
Autor	Jiří Martinek (ji_martinek@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Eucalyptus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Australská květenná říše, oblast australského severovýchodu a Tasmánská oblast
Biogeografické regiony - po..	Tasmánie

Zařazení

Pěstitelská skupina	Interiérová rostlina okrasná listem a Listnatý strom stálezelený
Pěstitelská skupina - pozná..	užitková rostlina
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	keře nebo stromy až 25–30 m vysoké, v kultuře do 3m; rychle roste a bohatě se větví
Výhony	šedě ojíňené, tvoří velké množství postranních výhonů
Listy	juvenilní listy vstříčné, přisedlé, vejčité až okrouhlé, 3-4 cm dlouhé a podobně široké, objímavé, vykrojené, šedozelené; adultní listy střídavé, eliptické nebo vejčité až široce kopinaté, čepel 4-8 x 1,2-3 cm velké, šedozelené, řapíky kulaté, 11-20 mm dlouhé; listy silně aromatické; mladé listy často modře ojíňené, u starších se ojíňení ztrácí; jarním řezem je tvorbu mladých výhonů možné podpořit
Květenství	okolík se 3 květy; stopky květenství mírně hranaté, 5–9 mm dlouhé
Květy	poupata kyjovitá až téměř cylindrická, krátce stopkatá (0-5 mm dlouhé);, 6-8 x 5 mm velká, víčko polokulovité, 2-3 x 3-5 mm velké, prašníky jsou podlouhlé až téměř kulovité; květy krémově bílé, se objevují v domovině již na mladých rostlinách
Plody	cylindrické nebo téměř baňkovité, 6-10 x 4-9 mm velké, dřevnaté

	tobolky, 4-dílné, mnohosemenné
Kůra a borka	hladká, (zelenavě) bílá; odlupuje se ve velkých plátech
Dlouhověkost	ve velmi dlouhověký druh

Nároky na stanoviště

Faktor světla	v létě slunné až polostinné, lze pěstovat venku, přezimování světlé
Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor tepla	studené skleníky či interiéry; teploty v zimě 2-10 °C.
Faktor vody	opatrná zálivka měkkou vodou tak, aby nevyschly kořenové baly
Faktor půdy	Mladé rostliny častěji přesazovat do humózního substrátu.

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Řez	zpětný řez rostlina snáší, ale dochází k výraznému poškození habitu
-----	---

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	leden - prosinec
Použití	chladné zimní zahrady; rostlina k řezu listové zeleně; užitková rostlina, čaje, inhalace
Choroby a škůdci	vzácně

Množení

Množení	Generativní, Předpěstování sadby, Vegetativní a Vrcholové řízk
Množení - poznámka	množení vrcholovými řízk obížné, lépe semeny

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník \(studený skleník\)](#)

Grafické přílohy

