

Taxon *Vitis vinifera* Jakubské

Název taxonu	Vitis vinifera Jakubské
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	´Jakubské´ (Ja)
Český název	réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	Burgundské modré rané, Skoré burgundské, Pinot noir précoce
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	subsp. vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	starobylá odrůda pocházející pravděpodobně z Francie; patně semenáč či mutace Rulandského modrého

Zařazení

Fytcenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Mošťová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	dle vedení, má slabší až středně bujný růst
Výhony	středně silné, tmavě hnědé, dobře vyžívající
Pupeny	malé, tupé
Listy	středně velké, většinou třílaločnaté se středně hlubokými horními výkroji, bazální výkroj je úzce otevřený; povrch listu je tmavě zelený, lehce vrásčitý
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	malý, hustý, válcovitý hrozen; bobule malá až středně velká, kulatá, tmavě modrá
Semena	středně velká, hruškovitá, s krátkým zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Možnost záměny taxonu (+..	´Rulandské modré´ (Ja je ranější)
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
----------------------	--------

Konec doby kvetení Květen

Doba zrání

Začátek doby zrání Srpen

Konec doby zrání Zář

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění
Faktor tepla	teplé polohy, mrazuvzdornost dobrá
Faktor vody	suché i příliš vlhké půdy jsou méně vhodné
Faktor půdy	spraše, hlinitopísčité půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	střední až vysoké vedení
Řez	na dlouhý tažeň, snáší však i krátký řez
Podnoží	na chudších půdách Kober 125 AA i Kober 5 BB, do hlubších a úrodnějších půd pak CR 2

Užitné vlastnosti

Použití	modrá moštová odrůda - výroba růžového a červeného vína, přímý konzum
Choroby a škůdci	citlivá na houbové choroby, zejména k plísni révové
Plodnost	raná, pravidelná, ale nižší (výnos 4-6 t/ha)

Množení

Množení	Roubování
Množení - poznámka	dá se množit také hřížením, dřevitými řízkami i mikropropagací
Popis vína	víno je rubínové barvy, odrůdově ovocné vůně i chuti
Doporučená technologie vína	jakostní a přívlastková červená vína

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [V / ZF - V - vinice \(řádek 112\)](#)

Ostatní

Odkazy

- http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf

Grafické přílohy

