

# Taxon Ammi majus

Název taxonu	Ammi majus
Vědecký název taxonu	Ammi majus
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">L.</a>
Český název	morač větší
Autor	Stanislav Vilím (stanislav_vil_m@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Druh</a>
Nadřazená kategorie	<a href="#">Ammi</a>

## Biogeografické regiony

---

Biogeografické regiony Atlanticko-eurosibiřská oblast

## Zařazení

---

Pěstitelská skupina	Letnička pravá
Pěstitelská skupina - pozná..	rod Ammi L. je zastoupen 6 druhy, druh Ammi majus na první pohled nezapře příbuznost s mnohými u nás rostoucími druhy z čeledi miříkovitých, i když jeho původ musíme hledat ve Středomoří, u nás se vyskytuje pouze na ojedinělých lokalitách jako zavlečený
Životní forma	Terofyt
Zařazení podle původu, nár...	letnička z přímého výsevu,

## Popisné a identifikační znaky

---

Habitus	tato pravá letnička, je-li pěstovaná, dosahuje výšky kolem 80–120 cm a je charakteristická velmi lehkou vzdušnou stavbou; k tomu přispívají jak dvakrát až třikrát peřenosečné listy s jemnými niťovitými úkrojky, tak velmi vzdušné okolíky, složené z mnoha malých okolíčků bílé barvy, okolíky bílé barvy jsou nesené na dlouhých stopkách a dorůstají průměru 10–15 cm, plod podobný kmínu.
Listy	peřenosečné listy s jemnými niťovitými úkrojky
Květenství	okolyčnaté bílé květenství
Květy	jednotlivé květy bílé drobné
Plody	plodem je dvounažka
Vytrvalost	není vytrvalá

## Doba kvetení

---

Začátek doby kvetení	Červenec
Konec doby kvetení	Říjen

Doba kvetení - poznámka    doba kvetení je závislá na mnoha faktorech, termínu výsevu, zálivce, obsah živin v půdě

## Nároky na stanoviště

---

Faktor světla - slunce    ✓

## Užitné vlastnosti

---

Použití	pestré záhony z přímého výsevu, řez (i komerčně na burzách), sušení, v léčitelství (plod)
Růstové i jiné druhově spec..	morač nepotřebuje předpěstování, vyséváme ho přímo na stanoviště v průběhu měsíce dubna, v teplejších oblastech našeho státu lze i na podzim, semena při klíčení vyžadují nižší teploty (neměly by přesáhnout 10 °C), proto je brzký výsev předpokladem úspěšného pěstování, pokud se spokojíme s menší kvalitou rostlin, můžeme vysévat až do července, je-li výsev příliš hustý, je vhodné semenáče po vzejití vyjednotit, u citlivých osob zejména v době květu rostliny a za vlhka, například za rosy, může dojít k vážnému podráždění pokožky až ke kožním zánětům a zpuchýřovatění, jde o fotodermatózní projev způsobený furokumariny, které jsou obsaženy ve všech částech rostliny, nejvíce v plodech

## Množení

---

Množení    Přímý výsev