

# Taxon lactuca sativa var longifolia

Název taxonu	lactuca sativa var longifolia
Vědecký název taxonu	Lactuca sativa
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">L. Lam.</a>
Český název	Salát římský
Autor	Miloš Jurica (milo_jurica@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Druh</a>
Vnitrodruhové jednotky	var. longifolia
Nadřazená kategorie	<a href="#">Lactuca</a>

## Biogeografické regiony

---

Biogeografické regiony - po.. Středomoří

## Zařazení

---

Pěstitelská skupina Letnička pravá a Listová a stonková zelenina  
Zařazení podle původu, nár... pěstuje se pro volnější protáhlou hlávku

## Popisné a identifikační znaky

---

Habitus	protáhla hlávka
Kořen	plytká kořenová soustava, křivý kořen krátký
Listy	tmavozelené s vystouplým žebrem, středové listy žluté
Květenství	za dlouhého dne prorůstá 0,8 - 1 m dlouhá dužnatá lodyha, nesoucí vrcholičnaté květenství, kvetení podporuje i vysoká teplota a sucho
Květy	žluté květy sestavené v úbor
Opylovací poměry	Cizosprašná
Plody	ochmýřená nažka
Semena	podle odrůdy stříbřité nebo hnědé barvy, HTS 0,8 - 1,2 g
Vytrvalost	jednoleté

## Doba kvetení

---

Doba kvetení - poznámka kvete za dlouhého dne

## Doba zrání

---

Začátek doby zrání Květen  
Konec doby zrání Říjen  
Doba zrání - poznámka dle termínu výsadby

## Nároky na stanoviště

---

Faktor světla - slunce	✓
Faktor tepla	nenáročný, rozte již při 4 °C, mladé rostliny snesou mráz do - 5 °C, klíčí při 16 - 20 °C, při 25 °C se snižuje klíčivost a nad 30 °C neklíčí
Faktor půdy	středně těžké, humózní, propustné s dobrou strukturou a s dobrou vodní jímavostí

## Užité vlastnosti

---

Použití	zelenina
Choroby a škůdci	okrajová nekróza listů, zasolení (salinita) půdy, virová mozaika salátu (Lettuce mosaic virus - LMV), bakteriální vadnutí salátu (bakterie <i>Pseudomonas marginalis</i> pv. <i>marginalis</i> ), podehnívání salátu (různe houby např. <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> , <i>S. minor</i> , <i>Botryotinia fuckeliana</i> , <i>Rhizoctonia solani</i> , plíseň salátu ( <i>Bremia lactucae</i> ), mšice (Aphidoidea), drátovec (Elaterridae)
Doporučený spon pro výsad..	0,3 x 0,3 m, přímý výsev 0,4 - 0,45 x 0,2 - 0,25 m

## Množení

---

Množení	Přímý výsev a Předpěstování sadby
---------	-----------------------------------

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [P 1: pole - záhon nejbliže státní silnice... / ZF - P - Experimentální zahrada - pole \(dle osevniho postupu\)](#)