

# Taxon *Apium graveolens* var. *dulce*

Název taxonu	<i>Apium graveolens</i> var. <i>dulce</i>
Vědecký název taxonu	<i>Apium graveolens</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">L.(Mill.) Pers.</a>
Český název	celer řapíkatý
Autor	Miloš Jurica (milo_jurica@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Druh</a>
Vnitrodruhové jednotky	var. <i>Dulce</i>
Nadřazená kategorie	<a href="#">Apium</a>

## Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Mediterránní oblast
Biogeografické regiony - po..	Středomoří

## Zařazení

Pěstitelská skupina	Dvouletka pravá a Kořenová zelenina
Pěstitelská skupina - pozná..	na konzum pěstovaná jako jednoletá, na semeno jako dvouletá
Zařazení podle původu, nár...	pěstuje se pro řapíky

## Popisné a identifikační znaky

Habitus	v prvním roce vytváří růžici listů s dlouhými silnými, rýhovanými řapíky, ve druhem roce 1,2- 1,5m vysoká květní lodyha
Listy	rýhované řapíky
Květenství	složený okolík
Květy	drobné, bílé
Plody	vejčitá žebematá dvounažka
Semena	hnědé barvy, HTS 0,2-0,3g
Vytrvalost	dvouletý

## Doba zrání

Začátek doby zrání	Září
Konec doby zrání	Listopad
Doba zrání - poznámka	sklizeň jednorázová

## Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor vody	650 mm srážek v době vegetačního období
Faktor půdy	hluboké humózní půdy, hlinité, vododržné, záhřevné

## Užitné vlastnosti

---

Použití	zelenina
Choroby a škůdci	srdéčkova hniloba celeru, virová mozaika celeru (Celery mosaic virus- CeMV), septoriová skvrnitost listů celeru (Septoria apiicola), Korkovitost bulev celeru (Phoma apiicola), háďatko severní (Meloidogyne hapla)
Doporučený spon pro výsad..	0,6 x 0,25 m

## Množení

---

Množení Předpěstování sadby

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [P 1: pole - záhon nejbliže státní silnice... / ZF - P - Experimentální zahrada - pole \(dle osevního postupu\)](#)