

Taxon *Vitis vinifera* Olsava

Název taxonu	Vitis vinifera Olsava
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	‘Olsava’ (Ol)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	KO-BO 39/28
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	česká stolní odrůda, vznikla křížením odrůd ‘Kossuth Lajos (Košťutův hrozen)’ x ‘Boskolena’

Zařazení

Fytcenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina - pozná..	stolní červeně zbarvená odrůda
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	střední bujný růst
Výhony	jednoleté réví je slabší až středně silné, hnědošedé barvy, dobře vyžívající
Pupeny	středně velké, širší, zahrocené
Listy	středně velké, pětilaločné, se středně hlubokými výkroji, řapíkový výkrojek je lyrovitý, otevřený; povrch listu je vrážitý, vespod mírně plstnatý
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	hrozen je velký, kuželovitý, hustý; bobule je kulatá, středně velká, modročervené barvy
Semena	středně velká, s dlouhým tupě zašpičatělým zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
----------------------	--------

Konec doby kvetení Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání Zář

Konec doby zrání Zář

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)
Faktor tepla	teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost dobrá
Faktor vody	příliš suché písčité půdy jsou méně vhodné
Faktor půdy	vhodná pro všechny typy půd
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	snáší všechny typy vedení
Řez	dlouhý i krátký řez
Podnoží	sprašové a hlinité půdy Kober 5 BB, slínovité a těžké půdy Kober 125 AA, pro vlhčí humózní půdy dobře zásobené vodou T 5C

Užitné vlastnosti

Použití	modrá stolní odrůda - přímý konzum
Choroby a škůdci	střední až nižší odolnost k houbovým chorobám, napadána obaleči
Plodnost	středně raná, pravidelná (výnos až 6-10 t/ha)

Množení

Množení	Roubování
Množení - poznámka	dá se množit i hřížením, dřevitými řízkami i mikropropagací
Popis vína	bobule jsou chruplavé, neutrální chuti, sladší

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [V / ZF - V - vinice \(řádek 126\)](#)

Ostatní

Odkazy

- http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf

Grafické přílohy

