Taxon Molinia arundinacea ´Transparent´

Název taxonu	Molinia arundinacea ´Transparent´
Vědecký název taxonu	Molinia arundinacea
Jména autorů, kteří taxon p...	Schrank
Odrůda	´Transparent´
Český název	bezkolenec rákosovitý
Synonyma (zahradnicky pou..	Molinia caerulea ssp. arundinacea (Schrank) H. K. G. Paul.; Molinia altissima Link.; Molinia caerulea ssp. litoralis (Host) Braun-Blanq.
Autor	Tatiana Kuťková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Molinia

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holarktická květenná říše a Cirkumboreální oblast

Zařazení

Fytocenologický původ	Původní druh roste na vlhkých loukách a na okrajích lesa; domácí druh; kultivar K. Partsch (1977)
Pěstitelská skupina	Trvalka zatahující
Pěstitelská skupina - pozná..	na zimu odumírá, na jaře je nutné seřezat celý trs těsně nad zemí
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus	trsnatá tráva; trs mohutný - v listu 50 - 70 cm, v květu 180 cm
Kořen	svazčitý kořen
Výhony	stébla vzpřímená, široce vejířovitě uspořádaná, tenká, hladká, s jedním kolénkem u báze
Listy	svěže zelené, asi 50 cm dlouhé a 1 cm široké, přibližně od poloviny převísající až k zemi.
Květenství	velmi jemné a velmi řídké laty, dlouhé až 70 cm, široké 10 cm jsou na stéblech vysoko nad listami. Laty s nádechem do fialova
Květy	květy jsou v květenstvích, základním květenstvím je klásek
Plody	obilka
Možnost záměny taxonu (+..	podobná jako ´Windspiel´. Od ní se liší jemnějším, lehčím a delším květenstvím.
Vytrvalost	mrazuvzdorná
Dlouhověkost	dlouhověká

Doba rašení	Pozdně na jaře rašící (V)
Doba rašení - poznámka	raší na začátku května

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Srpen
Konec doby kvetení	Srpen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	na plném slunci potřebuje dostatek vláhy
Faktor tepla	spolehlivě mrazuvzdorná; někdy mohou pozdní mrazíky poškozovat narašené listy
Faktor vody	vlhké, svěží půdy; suché zahradní půdy toleruje - dorůstá menších rozměrů
Faktor půdy	humózní, živné zahradní půdy

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetickéh..	od srpna do jara dalšího roku; jemnou textura, pohyb stébel ve větru
Použití - pro trvalky	OPD - Okraj porostu dřevin, VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPp - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, VPv - Volné plochy vřesovištního charakteru (písčité půdy bez přítomnosti Ca), A - Alpinum, Z - Záhon a OV - Okraj vody
Použití - pro trvalky - pozná..	široké možnosti uplatnění. Krásná solitéra, možnost použití i ve skupinách.
Použití	vhodná také k řezu v čerstvém i suchém stavu
Růstové i jiné druhově spec..	velmi jemná textura, pohyb stébel ve větru, barevná proměnlivost taxonu v průběhu roka - na podzim vybarvuje do intenzivní zlatožluté barvy
Doporučený spon pro výsad..	3 ks/m2

Množení

Množení	Dělení trsů
Množení - poznámka	brzy na jaře před rašením. Původní druh lze množit ze semen - musí projít obdobím chladu.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	• A 1: záhon podél dřevěnky, podrost pod stromy / ZF - A - Výsadby v okolí budovy A (A2) • S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník (SK33)

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš...	1998
Výsev/výsadba na stanoviš...	SK33 - 1998; A2 - 2010
Dodavatel	SK33 - původ neznámý; A2 - přemnožená z SK33

Grafické přílohy