

Taxon *Vitis vinifera* Sauvignon

Název taxonu	<i>Vitis vinifera</i> Sauvignon
Vědecký název taxonu	<i>Vitis vinifera</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	´Sauvignon´ (Sg)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	Sauvignon blanc, Fumé blanc, Fehér Sauvignon, Sovinjon
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	jde o starobylou odrůdu pocházející pravděpodobně z Francie, odrůda vznikla zřejmě křížením ´Chenin blanc´ x ´Tramín´

Zařazení

Fytocenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Mošťová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	dle vedení, má bujný růst, tvoří mnoho fazochů
Výhony	jednoleté réví je středně silné až silné, světle hnědé, vyžívá dobře
Pupeny	malé, zahrocené, u báze rozšířené
Listy	středně velké, okrouhlé, pětilaločnaté s hlubokými výkroji, bazální výkroj je lyrovitý, otevřený; povrch listu je zprohýbaný, slabě puchýřovitý, vespod plstnatý
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	malý, válcovitý někdy na bázi rošířený, hustý s krátkou stopkou; bobule je malá až střední, kulatá, žlutozelená, povrch je ojněný s tečkami
Semena	tmavě hnědá, hruškovitá, s kratším zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech

Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání	Září
Konec doby zrání	Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)
Faktor tepla	teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost dobrá
Faktor vody	příliš suché i těžší vlhké půdy jsou méně vhodné
Faktor půdy	nepříliš suché hlinitopísčité, písčité i kamenité půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	střední i vysoké vedení
Řez	na dlouhý tažeň, snáší i krátký řez
Podnož	do vlhčích půd T 5C či SO 4, do sušších CR 2 a Kober 125 AA

Užitné vlastnosti

Použití	bílá moštová odrůda - výroba bílého vína, přímý konzum
Choroby a škůdci	střední odolnost k houbovým chorobám, poškozována obaleči
Plodnost	pozdní, pravidelná (výnos 8-10 t/ha)

Množení

Množení	Roubování
Množení - poznámka	dá se množit i hřížením, dřevitými řízkami i mikropropagací
Odrůdy	klony PE-6/5, PE-13/49, PE-13/67, PE-5/15
Popis vína	vůně vína je ovocná, jemně kořenitá; chuť je také ovocná, podobná odrůdě Müller Thurgau, avšak často s "travnatější" dochutí
Doporučená technologie vína	jakostní a přívlastková bílá vína

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [V / ZF - V - vinice \(řádek 113\)](#)

Grafické přílohy

