

Taxon *Tolmiea menziesii*

| | |
|--------------------------------|--|
| Název taxonu | <i>Tolmiea menziesii</i> |
| Vědecký název taxonu | <i>Tolmiea menziesii</i> |
| Jména autorů, kteří taxon p... | (Pursh) Torr. Et A. Gray (1840) |
| Český název | tolmiea |
| Synonyma (zahradnický pou.. | <i>Tiarella menziesii</i> Pursh; <i>Heuchera menziesii</i> (Pursh) Hook. |
| Autor | Jiří Martinek (ji_martinek@unknown.cz) |
| Kategorie | Druh |
| Nadřazená kategorie | Tolmiea |

Biogeografické regiony

| | |
|-------------------------------|--|
| Biogeografické regiony | Holartická květenná říše, Cirkumboreální oblast, oblast Skalistých hor (severozápad SA) a oblast Sierra Madre (jihozápad SA) |
| Biogeografické regiony - po.. | Severní Amerika: od Aljašky po Kalifornii |

Zařazení

| | |
|---------------------|---|
| Pěstitelská skupina | Trvalka stálezelená a Interiérová rostlina okrasná listem |
| Životní forma | Kryptofyt |

Popisné a identifikační znaky

| | |
|------------|---|
| Habitus | stálezelená trvalka dorůstající výšky 20-30 cm; hustá kompaktní kulovitá růžice |
| Kořen | krátký oddenek |
| Listy | v přzemní růžici; dlouze řapíkaté, vejčité listy s 5 - 7mi laločnatými okraji, 7-12 x 6-10 cm, srdčitá báze, okraj 2x pilovitý; vytváří nové dceřinné růžice i s kořínky (ztv. viviparia) v místě nasazení listového řapíku na čepel; celá rostlina jemně chlupatě pýřitá |
| Květenství | hroznovité, 15-24 cm dlouhé |
| Květy | trubkovité, zelenohnědé, nenápadné; v pěstování kvete zřídka |

Nároky na stanoviště

| | |
|--------------------------|---|
| Faktor světla - slunce | ✓ |
| Faktor světla - polostín | ✓ |
| Faktor světla - poznámka | světlo až polostín; letnění na chráněných stanovištích před přímým světlem |
| Faktor tepla | poloteplý až studený skleník či interiér; v zimě (10-)12-15°C; krátkodobé poklesy teplot k 0 °C |
| Faktor vody | v létě vydatná zálivka, v zimě jen mírně vlhký bal; při teplém |

| | |
|-------------|---|
| | přezimování vyžaduje rosení |
| Faktor půdy | humózní substrát s podílem zahradní zeminy; pH 5,8 až 6,5 |

Užitné vlastnosti

| | |
|--------------------------------|--|
| Období hlavního estetického... | leden až prosinec |
| Použití | závěsné nádoby, listy rychle přerostou okraj nádoby; do světlých podrostů jako půdní pokrýv; v současnosti spíše doplňkový sortiment |
| Choroby a škůdci | listové mšice a svilušky |

Množení

| | |
|---------|---|
| Množení | Generativní, Předpěstování sadby, Vegetativní, Listové řízky a Dělení trsů |
| Odrůdy | 'Maculata' - světle zelený list se smetanovými nebo nažloutlými skvrnami; 'Taff's Gold' - světle zelený list se žlutými skvrnami; 'Variegata' - světle zelený list se smetanovými nebo žlutými skvrnami |

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník \(teplý skleník\)](#)

Ostatní

| | |
|----------|---|
| Poznámka | lidové pojmenování: "slepice a kuřátka" |
| Odkazy | <ul style="list-style-type: none">• http://www.tropicos.org/Name/29100117?tab=references• http://www.tropicos.org/Name/29100117?tab=chromosomecounts |

Grafické přílohy

