

# Taxon *Brassica oleracea* var. *gemmifera*

Název taxonu	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>gemmifera</i>
Vědecký název taxonu	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>gemmifera</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">L. DC.</a>
Český název	kapusta růžičková
Autor	Miloš Jurica (milo_jurica@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Druh</a>
Vnitrodruhové jednotky	convar. <i>oleracea</i> var. <i>gemmifera</i>
Nadřazená kategorie	<a href="#">Brassica</a>

## Biogeografické regiony

---

Biogeografické regiony - po.. Belgie

## Zařazení

---

Pěstitelská skupina	Dvouletka pravá a Košťálová zelenina
Pěstitelská skupina - pozná..	na konzum pěstovaná jako jednoletá, na semeno jako dvouletá
Zařazení podle původu, nár...	pěstuje se pro laterální pupeny - růžičky v úžlabí listů

## Popisné a identifikační znaky

---

Habitus	0,4 - 1 m vysoký stonek
Kořen	dobře vyvinutý kořenový systém
Pupeny	laterální pupeny v průměru 10 - 40 mm
Listy	řapíkaté listy v genetické spirále, opak vejčité, celokrajné s bublinatým povrchem
Květenství	latovité květenství
Plody	šešule
Semena	HTS 3 - 4 g
Vytrvalost	dvouletý

## Nároky na stanoviště

---

Faktor světla - slunce	✓
Faktor vody	vyšší půdní a vzdušná vlhkost
Faktor půdy	řepařské a bramborářské výrobní oblasti, pH 6,2 - 7,5

## Užité vlastnosti

---

Použití	zelenina
Choroby a škůdci	nekrózy vnitřních listů hlávek, okrajové nekrózy (spály) listů, bakteriální černá žilkovitost brukvovitých ( <i>Xantomonas campestris</i> )

pv. campestris), nádorovitost brukvovitých (původce Plasmodiophora brassicae), plíseň brukvovitých (Peronospora parasitica), alternáriová skvrnitost brukvovitých (Alternaria brassicicola a A. brassicae), květílka zelná (Delia radicum), mšice zelná (Brevicoryne brassicae), dřepčák (Phyllotreta ssp.), krytonosec (Ceutorhynchus), bělásek zelný (Pieris brassicae), bělásek řepový (P. rapae), můra zelná (Mamestra brassicae), můra kapustová (Lacanobia oleracea), osenice polní (Agrotis segetum), záředníček polní (Plutella xylostella), molice vlašovičnicková (Aleyrodes proletella), bejlmorka zelná (Contarinia nasturtii), třásněnka (Trips spp.)

Doporučený spon pro výsad.. 0,6 x 0,6 m, u vysokých odrůd 0,5 - 0,7 x 0,7 m

## Množení

---

Množení Předpěstování sadby

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [P 1: pole - záhon nejbliže státní silnice... / ZF - P - Experimentální zahrada - pole \(dle osevního postupu\)](#)