

# Taxon *Vitis labrusca champion*

Název taxonu	<i>Vitis labrusca champion</i>
Vědecký název taxonu	<i>Vitis labrusca</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">Linné</a>
Odrůda	‘Champion’ (Cha)
Český název	réva liščí
Synonyma (zahradnický pou..)	Šampion
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Odrůda</a>
Nadřazená kategorie	<a href="#">Vitis</a>

## Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	jde o americkou labruskovou odrůdu, vzešlou z křížení odrůd ‘Concord’ x ‘Hartford’

## Zařazení

Pěstitelská skupina	Mošťová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

## Popisné a identifikační znaky

Habitus	středně bujný až bujnější růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné, tmavěji hnědé, dobře vyzrávajících
Pupeny	menší, zahrocené
Listy	středně velké až velké, pavézovité, tři až pětilaločné s výraznějšími horními výkroji, bazální výkroj je lyrovitý, otevřený; povrch mírně vrásčitý, vespod silně bíle plstnatý (u starších listů rezavě)
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	menší až středně velký, spíše válcovitý hrozen, volnější, na krátké stopce; bobule je středně velká, kulatá, tmavomodré později až skoro černé barvy, ojíňená
Semena	středně velká, hruškovitá, s kratším zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano

Doba rašení Na jaře rašící (IV)

## Doba kvetení

---

Začátek doby kvetení Květen

Konec doby kvetení Květen

## Doba zrání

---

Začátek doby zrání Srpen

Konec doby zrání Srpen

## Nároky na stanoviště

---

Faktor světla - slunce ✓

Faktor světla - poznámka vyžaduje kvalitní oslunění

Faktor tepla teplé polohy, mrazuvzdornost dobrá

Faktor vody méně vhodné jsou těžší půdy

Faktor půdy úrodnější hlinité či hlinitopísčité půdy

Faktor půdy - vápnomilný ✓

Faktor půdy - poznámka ovlivňujeme podnoží

## Agrotechnické vlastnosti a požadavky

---

Vhodnost vedení vysoké i střední vedení

Řez na dlouhý tažeň, snáší dobře i krátký řez

Podnož do horších půdních podmínek Kober 125 AA i 5 BB, do úrodnějších půd CR 2 i SO 4

## Užitné vlastnosti

---

Použití modrá moštová odrůda - výroba burčáku i lehčího červeného vína

Choroby a škůdci vyšší odolnost k houbovým chorobám, občas plísňí révovou

Plodnost raná, pravidelná (výnos 8-15 t/ha)

## Množení

---

Množení Roubování

Množení - poznámka dá se množit i hřížením, dřevitými řízkami i mikropropagací

Popis vína víno je slaběji rubínově červené, silně aromatické, voní po lesních jahodách, z přezrálých hroznů spíše aronii až asfaltu

Doporučená technologie vína burčák, stolní, jakostní a přívlastková červená vína, rosé

## Celky sbírek

---

- [V / ZF - V - vinice \(řádek 128\)](#)

## Grafické přílohy

---

