

Taxon *Vitis vinifera* Alphonse

Název taxonu	Vitis vinifera Alphonse
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	´Alphonse lavallée´ (AL)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	Royal modrý, Black Marocco, Ribier noir, Blauer Damascener
Autor	Petra Bábíková (petra_b_b_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	původ odrůdy ani její křížení není přesně známo, nejčastěji se uvádí křížení ´Bellino´ x ´Lady down´s seedling´

Zařazení

Fytcenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Liána opadavá
Pěstitelská skupina - pozná..	modrá stolní odrůda révy
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	má středně bujný až bujný růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné, červenohnědé, dobře vyzrávající
Pupeny	středně velké, širší, zašpičatělé
Listy	velké, nejčastěji třílaločné se středně hlubokými horními výkroji, řapíkový výkrojek je lyrovitý, otevřený; povrch listu je vrásčitý, vespod plstnatý
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	středně velký až velký hrozen, spíše kuželovitý, křídlatý, volnější; bobule je velká, spíše kulatá (nepravidelného tvaru), tmavě modrá
Semena	velká, s delším zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
----------------------	--------

Konec doby kvetení Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání Zář
Konec doby zrání Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce ✓
Faktor světla - poznámka vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)
Faktor tepla teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost dobrá
Faktor vody příliš suché půdy jsou méně vhodné
Faktor půdy hlinité či hlinitopísčité půdy
Faktor půdy - vápnomilný ✓
Faktor půdy - poznámka ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení střední i vysoké vedení
Řez na dlouhý tažeň i delší čípky
Podnoží na chudších půdách Kober 125 AA či 5 BB, do hlubších a úrodnějších půd pak CR 2 či SO 4

Užitné vlastnosti

Použití stolní odrůda - přímý konzum
Choroby a škůdci středně odolná k houbovým chorobám
Plodnost pozdní, pravidelná (výnos 7-12 t/ha)

Množení

Množení Roubování
Množení - poznámka dá se množit i hřížením, dřevitými řízkami i mikropropagací
Popis vína dužnina bobule je masitá, vynikající ovocné chuti

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [V / ZF - V - vinice \(řádek 93\)](#)

Ostatní

Odkazy

- http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf