

Taxon Brassica oleracea var. acephala

Název taxonu	Brassica oleracea var. acephala
Vědecký název taxonu	Brassica oleracea var. acephala
Jména autorů, kteří taxon p...	DC.
Český název	kadeřávek; kapusta kadeřavá
Autor	Miloš Jurica (milo_jurica@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Vnitrodruhové jednotky	var. acephala
Nadřazená kategorie	Brassica

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po.. Středozeří

Zařazení

Pěstitelská skupina Dvouletka pravá a Košťálová zelenina
Pěstitelská skupina - pozná.. na konzum pěstovaná jako jednoletá, na semeno jako dvouletá
Zařazení podle původu, nár... pěstuje se pro silně zkadeřavené listy

Popisné a identifikační znaky

Habitus	různě vysoký košťál růžice listů
Kořen	hlouběji zasahující
Listy	laločnaté, listová čepel většinou silně zkadeřavená
Opylovací poměry	Cizosprašná
Plody	šešule
Vytrvalost	dvouletý

Doba zrání

Začátek doby zrání Zář
Konec doby zrání Prosinec
Doba zrání - poznámka 90 - 160 dní

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor tepla	snáší -12 až -15 °C
Faktor půdy	pH 6,3 - 7,8, vhodná bramborářská oblast

Užité vlastnosti

Použití	zelenina
Choroby a škůdci	nekrózy vnitřních listů hlávek, okrajové nekrózy (spály) listů, bakteriální černá žilkovitost brukvovitých (<i>Xantomonas campestris</i> pv. <i>campestris</i>), nádorovitost brukvovitých (původce <i>Plasmodiophora brassicae</i>), plíseň brukvovitých (<i>Peronospora parasitica</i>), alternáriová skvrnitost brukvovitých (<i>Alternaria brassicicola</i> a <i>A. brassicae</i>), květ ilka zelná (<i>Delia radicum</i>), mšice zelná (<i>Brevicoryne brassicae</i>), dřepčík (<i>Phyllotreta</i> ssp.), krytonosec (<i>Ceutorhynchus</i>), bělásek zelný (<i>Pieris brassicae</i>), bělásek řepový (<i>P. rapae</i>), můra zelná (<i>Mamestra brassicae</i>), můra kapustová (<i>Lacanobia oleracea</i>), osenice polní (<i>Agrotis segetum</i>), zářezník polní (<i>Plutella xylostella</i>), molice vlašťovičnicková (<i>Aleyrodes proletella</i>), bejlmorka zelná (<i>Contarinia nasturtii</i>), třásněnka (<i>Trips</i> spp.)
Doporučený spon pro výsad..	polovysoký 0,4 - 0,5 x 0,5 m, vysoký 0,5 - 0,6 x 0,6 m

Množení

Množení Přímý výsev a Předpěstování sadby

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [P 1: pole - záhon nejbliže státní silnice... / ZF - P - Experimentální zahrada - pole \(dle osevního postupu\)](#)