

# Taxon *Eremurus stenophyllus*

Název taxonu	<i>Eremurus stenophyllus</i>
Vědecký název taxonu	<i>Eremurus x isabellinus</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">(Boiss. &amp; Buhse) Baker</a>
Odrůda	‘Pinokkio’
Český název	liliochvostec
Autor	Stanislav Vilím (stanislav_vil_m@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Odrůda</a>
Nadřazená kategorie	<a href="#">Eremurus</a>

## Biogeografické regiony

---

Biogeografické regiony	Íránsko-turanská oblast
Biogeografické regiony - po..	Střední Asie - Írán, Afghánistán, Pákistán

## Zařazení

---

Pěstitelská skupina	Hlíznatá rostlina
Životní forma	Kryptofyt
Životní forma - poznámka	zatahující geofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

## Popisné a identifikační znaky

---

Habitus	přízemní růžice listů s vysokými stvoly převyšujícími výrazně růžici listů, stvoly jsou zakončeny dlouhým úzkým květenstvím
Kořen	vícečetně hvězdovitý, hlíznatý, s výrazným vystoupavým pupenem uprostřed (připomíná medúzu)
Pupeny	5 x 10 mm uprostřed hlíznatého hvězdovitého kořene
Listy	uspořádané v listové růžici, dlouhé cca 0,5 m, u báze širší - 20 mm, ke špičce zužující se, v době květu od špičky zasychající
Květenství	válcovitý hrozen na stvolu cca 1,2 m dlouhém, vlastní květenství je dlouhé 0,5 - 0,6 m, květy v květenství vykvétají od spodu směrem vzhůru
Květy	žluté, šestičetné, odkvetlé květy jsou hnědé a vytrvávající
Plody	kulatá třípouzdrá tobolka o průměru cca 5 - 8 mm
Semena	černá, asi 2 - 3 mm dlouhá, podobná semenům cibule kuchyňské či pažitky
Vytrvalost	na teplém a výhřevném, propustném stanovišti vytrvalý
Dlouhověkost	dlouhověký taxon, na příznivých stanovištích přetrvává několik desítek let

Doba rašení	Na jaře rašící (IV)
Doba rašení - poznámka	raší v závislosti na průběhu jarního počasí a teplotě vzduchu i vegetační vrstvy půdy

## Doba kvetení

---

Začátek doby kvetení	Duben
Konec doby kvetení	Květen
Doba kvetení - poznámka	kvete cca 3 až 4 týdny v závislosti na teplotě vzduchu a na orientaci stanoviště ke světovým stranám
Remontování - poznámka	neremontuje, po odkvětu listy postupně žloutnou od špičky k bázi listu až úplně uschnou a zatáhnou; na konci června jsou rostliny již zatažené, ale odkvetlé květenství může přetrvávat

## Doba zrání

---

Doba zrání - poznámka	semena dozrávají v třípouzdrých kulatých nejprve zelených tobolkách, i když listy rostliny jsou již suché, tobolky po úplném dozrání také usychají a zhnědnou
-----------------------	---

## Nároky na stanoviště

---

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	zpravidla je ideální plné oslunění během celého dne
Faktor vody	v době své vegetace potřebuje půdní vláhu, v období klidu vyžaduje relativní sucho
Faktor půdy	vyžaduje hlavně propustné stanoviště v zimním období,

## Užitné vlastnosti

---

Období hlavního estetického..	v době kvetení
Použití - pro trvalky	VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPz - Volné plochy záhonového charakteru, VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca), KS - Kamenitá stanoviště (stanoviště s přítomností kamenů), KSss - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon) a Z - Záhon
Použití - pro trvalky - pozná..	květenství jsou komerčně nabízená jako řezaná květina; nachází uplatnění ve floristice květenství jsou vhodná k řezu, komerčně se s nimi obchoduje na květinových burzách; nacházejí uplatnění ve floristice
Použití	výrazná solitera, vhodná jak pro intenzivně ošetřované záhony tak

	pro přírodě podobné VP - stylizace rovinatých či skalnatých stepí, vhodná kombinace s travinami, jinými xerofytními trvalkami či drobnými poleřeři a keřičky;
Choroby a škůdci	v ČR zpravidla netrpí chorobami ani škůdci, na vlhkém stanovišti může být napaden houbovými patogeny
Růstové i jiné druhově spec..	po odkvětu zatahuje

## Množení

---

Množení - poznámka	množí se výsevem semen na podzim, dopěstování do květuschného stavu trvá 3 až 5 let, odrůdy se množí dělením trsů (dělením vzrostlých hlíznatých kořenů s pupeny)
Odrůdy	řada odrůd na trhu lišících se výškou, barvou květenství, např. 'Highdown Gold' - tmavě žluté květy, 'Magnificus' - jasně žluté květy, 'Sulphureus' - sírově žluté květy nebo hybridního původu, často v zahradnické praxi označovaných E x isabellinus nebo tzv. Shelford hybridy (E.stenophyllus x E.olgae) či Ruiters hybridy - barva b, r, o, ž - pastelové odstíny. Např. 'Tango', 'Cleopatra', 'Emmy Ro', Pinokkio a jiné

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [Z 6: záhon 6 / ZF - Z - Akademická zahrada \(Z 6: 'Pinokkio'\)](#)

## Ostatní

---

Výsev/výsadba na stanoviš...	XI/2015: Z 6: 'Pinokkio'
Dodavatel	Z 6: 'Pinokkio': Jost Import Heřmanův Městec

## Grafické přílohy

---

