

# Taxon *Nerium oleander*

Název taxonu	Nerium oleander
Vědecký název taxonu	Nerium oleander
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">L. (1753)</a>
Odrůda	´Petite Salmon´
Český název	oleandr obecný
Synonyma (zahradnický pou..	Nerium indicum Mill.; Nerion oleandrum St.-Lag., Oleander vulgaris Medik.
Autor	Jiří Martinek (ji_martinek@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Druh</a>
Nadřazená kategorie	<a href="#">Nerium</a>

## Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holartická květenná říše, Mediterránní oblast, Saharsko-arabská oblast a Iránsko-turanská oblast
Biogeografické regiony - po..	Evropa: Iberský pol. Francie, Apeninský pol. Balkánský pol., Turecko; Střední Východ, Irán, severozápadní Afrika, Libye, naturalizován: Krym, Kavkaz

## Zařazení

Fytcenologický původ	stanoviště kolem vodních toků, objevuje se často i na okrajích městských sídlišť, na stanovištích dotčených lidskou činností
Pěstitelská skupina	Interiérová rostlina okrasná květem, Listnatý keř stálezelený a Léčivá rostlina
Životní forma	Fanerofyt

## Popisné a identifikační znaky

Habitus	široce rozkladitý keř nebo malý strom, 5(-6) m vysoký; bohatě větvený
Výhony	větve hladké, tuhé, rovné
Listy	vštržčné nebo v trojčetném přeslenu; (úzce) kopinaté až kopinatě eliptické nebo podlouhle kopinaté, kožovité, tmavě zelené, 6–22 x 1–3 cm široké, na vrcholku tupě špičaté, báze zúžená, klínovitá, svrchu lesklé, naspodu pýřité; krátce řapíkaté
Květenství	vrcholičnaté laty či chocholičnaté vrcholíky
Květy	5četné a stopkaté; kalich plstnatý; koruna nálevkovitá, bílá, růžová, červená a žlutá, jednoduchý i plnokvětý, 2–4 cm široká; trubka 2 cm, laloky 20–25 mm, tupé až špičaté, kopinaté; kalich

uvnitř hustě žláznatý, kališní cípy zašpičatělé, tyčinky štětinatě pýřité; v průměru 3–4 cm; vonné  
Plody měchýřky 8–16 × 0.5–1 cm velké, červenavě hnědé

## Doba kvetení

---

Začátek doby kvetení Červen  
Konec doby kvetení Zář

## Nároky na stanoviště

---

Faktor světla - slunce ✓  
Faktor světla - polostín ✓  
Faktor světla - poznámka plné slunce, minimální intenzita 1000 lx  
Faktor tepla studený skleník či interiér; teploty v zimě 5–10 °C; chráněné před mrazem; letnění v teplé a slunné poloze  
Faktor vody v průběhu vegetace intenzivnější zálivka; omezená zimní zálivka  
Faktor půdy Hlinitý humózní substrát, pH 6,0 až 7,0

## Agrotechnické vlastnosti a požadavky

---

Řez snáší výborně i poměrně hluboký zpětný řez

## Užitné vlastnosti

---

Období hlavního estetického květení až září  
Použití nádobová rostlina pro terasy, balkóny, zahrady; v zimě světlé a studené chodby, haly, verandy  
Choroby a škůdci červci, puklice, vlnatky; *Aspidiotus nerii* - štítenka břechťanová, *Pseudaulacaspis pentagona* - štítenka morušová; houbová skvmitost listů (*Ascochyta*), rakovina oleandru a bakteriální onemocnění  
Růstové i jiné druhově spec. rostlina jedovatá; v minulosti byl používán v lékařství, nutno však zdůraznit, že celá rostlina je prudce jedovatá, smrtelnou otravu může údajně způsobit pouhá tepelná úprava jídla na ohni ze dřeva oleandru

## Množení

---

Množení Generativní, Předpěstování sadby, Vegetativní, Dřevité řízky, Vrcholové řízky a Osní řízky  
Množení - poznámka řízkováním (nejlépe v II nebo VIII), na jaře semeny.  
Odrůdy *Agnes Darac'* - květy plné, tmavě červené; *'Album Grandiflorum'* - květy jednoduché, bílé s růžovým nádechem; *'Album Maximum'* -

květy jednoduché, čistě bílé; 'Album Plenum' - květy poloplné, bílé; 'Album' - květy bílé; 'Algiers' - středně velký; květy červené, ne tak tmavé jako Nerium oleander 'Hardy Red'; 'Apple Blossom' - středně velký až velký; květy růžové; 'Atropurpureum' - květy červené; 'Claude Blanc' - květy plné, zářivě červené; 'Coccineum Simplex' - květy jednoduché, světle červené; 'Conte Pusteria Cortesia' - květy jednoduché, meruňkově žluté; 'Et na' - květy jednoduché, zářivě purpurové; 'Flavescens' - květy světle žluté, poloplné; 'Franklin D. Roosevelt' - květy lososově růžové a posléze oranžové; středně velký až velký; 'General Pershing' - velký; květy plné, červené; 'George Sealy' - velký; květy růžové, jednoduché; 'Hardy Red' - vysoký; květy tmavě červené; 'Henry Rosenberg' - středně velký; květy růžové, hvězdovité; 'Imperio', květy jednoduché, lososově oranžové; 'Jean Gallen' - květy plné, růžové; 'Louis Pouget' - květy plné, masově růžové; 'Lutescens' - květy žluté; 'Luteum Plenum' - květy plné, světle žluté; 'Madoni Grandiflorum' - květy plné, bílé; 'Matilde Ferrier' - velký; květy plné, žluté; 'Mrs. Eugenia Fowler' - vysoký; květy růžové, plné; 'Mrs. George Roeding' - středně velký; květy plné, lososové; 'Mrs. Robertson' - velký; květy třešňové; 'Mrs. Runge' - středně velký až velký; listy žlutopestré; květy vonné, plné, tmavě růžové; 'Mrs. Willard Crooke', velký; květy bílé, mají středový růžový pruh; 'Petite Pink' - zakrslý, kompaktní; květy jednoduché, růžové; 'Pierre Gallen' - květy poloplné, růžové; 'Pierre Rondier' - květy plné, karmínově červené; 'Pleasants Postoffice Pink' - vysoký; květy středně růžové, jednoduché; 'Prof. Blanchon' - květy plné, oranžovočervené; 'Rayanat' - květy plné, meruňkově žluté; 'Roseum' - květy růžové; 'Solfatare' - květy jednoduché, sírově žluté; 'Sorrento' - středně velký; květy plné, žluté; 'Splendens' - květy plné, růžové; 'Sue Hawley-Oakes' - středně velký; květy krémově žluté se žlutým jícnem; 'Suor Lisa' - květy jednoduché, tmavě červené; 'Turners Carnival' - zakrslý; květy lososové, zvlňené; 'Turners Shari D' - středně velký; květy jednoduché, žluté, ve velkých chomáčích; 'Variegatum' - listy žlutě a bíle skvrnitě; 'Virginie' - květy jednoduché, zářivě růžové

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [Park - Palmový skleník / Zámecký park v Lednici](#)
- [S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník \(studený skleník\)](#)

## Ostatní

---

### Odkazy

- <http://www.tropicos.org/Name/1800765?tab=references>
- <http://www.tropicos.org/Name/1800765?tab=chromosomecounts>

## Grafické přílohy

---

