

Taxon *Vitis vinifera* Dokucajev

Název taxonu	Vitis vinifera Dokucajev
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	´Ustojčivj Dokučajevoj´ (UD)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	Hrozen Dokučajevové
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	jde o ukrajinskou odrůdu, vznikla křížením odrůd (´Khat al-Baar´ x ´Mathiasz János´) x ´Dattier de Saint-Vallier´

Zařazení

Fytcenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Liána opadavá
Pěstitelská skupina - pozná..	bílá stolní odrůda révy
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	má středně bujný růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné až silné, kaštanově hnědé, dobře vyžrávajících
Pupeny	středně velké, širší, tupé
Listy	středně velké až velké, pětilaločnaté s mírnějšími výkroji, řapíkový výkrojek je lyrovitý, otevřený; povrch listu je lehce vrásčitý
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	velmi velký hrozen, kuželovitý, středně hustý až hustý; bobule je velmi velká, podlouhle oválná, zelenožlutá
Semena	velká, s delším zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
----------------------	--------

Konec doby kvetení Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání Říjen
Konec doby zrání Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce ✓
Faktor světla - poznámka vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)
Faktor tepla teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost dobrá
Faktor vody příliš suché písčité půdy jsou méně vhodné
Faktor půdy hlinité či hlinitopísčité půdy
Faktor půdy - vápnomilný ✓
Faktor půdy - poznámka ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení střední i vysoké vedení
Řez na dlouhý tažeň
Podnoží na chudších půdách Kober 125 AA , do hlubších a úrodnějších půd pak CR 2 i SO 4

Užitné vlastnosti

Použití stolní odrůda - přímý konzum
Choroby a škůdci odolnější k houbovým chorobám, citlivější na plíseň šedou
Plodnost pozdní, pravidelná (výnos 7-12 t/ha)

Množení

Množení Roubování
Množení - poznámka dá se množit i hřížením, dřevitými řízkami i mikropropagací
Popis vína dužnina bobule je masitá, chuť je mírně kořenitá, u méně vyzrálých bobulí až trávovitá

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [V / ZF - V - vinice \(řádek 129\)](#)

Ostatní

Odkazy

- http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf

Grafické přílohy

