

Taxon *Achillea ptarmica*

Název taxonu	<i>Achillea ptarmica</i>
Vědecký název taxonu	<i>Achillea ptarmica</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné (1753)
Odrůda	‘La Perle’
Český název	řebříček bertrám
Autor	Jiří Uher (ji_uher@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	var. liguliflora Čelakovsky
Nadřazená kategorie	Achillea

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holartická květenná říše a Atlanticko-eurosibiřská oblast
Biogeografické regiony - po..	po celém evropském mírném pásu z Francie a Británie po Ukrajinu

Zařazení

Fytocenologický původ	helorgadofyt: mokré a rašelinné louky, břehy vodních toků z nížiny k 1000 m n.m. v horách
Pěst itelská skupina	Trvalka zatahující
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Za - záhonová trvalka

Popisné a identifikační znaky

Habitus	výběžkatě trsnatá, vzpřímená, jen v květenství větvená, až metr vysoká trvalka
Kořen	adventivní kořeny z krátkých i výběžkatě kolonizujících oddenků
Výhony	přímé, oblé, shora větvené a řídce vlnaté, níže olysalé, hustě olistěné
Listy	střídavé, lineárně podlouhlé s až dvakrát ostře pilovitými okraji, v mládí vespod pýřité, brzy olysávající
Květenství	úbořky s 8-14 paprsky, seskládané až po čtyřiceti v chocholičnaté latě
Květy	pětičetné se zaniklými kalichy, srostloplátečné, haplostemonické; paprsky zygomorfnní, plodné (samičí), krátké, bílé; početné kvítky disku koleomorfnní, oboupohlavné, bělavé
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	klínovité, leskle šedé nažky bez chmýru
Semena	vysévány jsou celé nažky

Možnost záměny taxonu (+..	zaměnitelná s blízkou <i>A. salicifolia</i> Besser s širšími, pýřitými, žláznatě tečkovanými listy a drobnějšími úbory, stav nadto komplikován hybridy obou druhů; také s východoasijskými <i>A. acuminata</i> Ledeb. a <i>A. sibirica</i> Ledeb. (obě s větší úbory s 10-22 paprsky, u poslední růžovými)
Dlouhověkost	dlouhověká
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červenec
Konec doby kvetení	Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	heliofyt; osivo vzchází na světle, fotoperiodická květní tvorba (viz níže)
Faktor tepla	mrazuvzdorná údajně do -36°C (USDA); vernalizace 5°C po dobu 12-15 týdnů podporuje květní tvorbu i tvorbu stolonů; výsevy 18°C-20°C, poté snížení teplot k 14°C-16°C pro dopěstování rostlin k expedici
Faktor vody	vysoké požadavky na živiny a vodu zejména ku konci jara při elongaci květních stonků
Faktor půdy	přizpůsobivá v provzdušněných, spíše kyselých (pH 6.0 - 7.0) půdách
Faktor půdy - poznámka	každoročně v předjaří 8-10 kg plných hnojiv pro ar

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického..	v době kvetení
Použití - pro trvalky	OPD - Okraj porostu dřevin, VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPz - Volné plochy záhonového charakteru, Z - Záhon, OV - Okraj vody a OV1 - Okraj vody - zóna mělkých močálů a bažin
Použití - pro trvalky - pozná..	Fr3 so (VP, mokré půdy na slunci), doplňkově WR3 so (=OV)
Choroby a škůdci	z nejvýznamnějších ascomycety (<i>Erysiphe</i> , <i>Sclerotium</i> , <i>Alternaria</i> , <i>Phyllachora</i> , <i>Elsinoe</i>) a rzi (<i>Coleosporium</i> , <i>Puccinia</i> , <i>Uromyces</i>); ze škůdců mšice (<i>Aulacorthum</i> , <i>Brachycaudus</i> , <i>Masonaphis</i>), síťnatky (<i>Corythucha</i>), vrtalky (<i>Liriomyza</i> , <i>Nemorimyza</i>), květilký (<i>Botanophila</i> , <i>Pegohylemyia</i>), vrtule (<i>Paroxyna</i> , <i>Campiglossa</i> , <i>Cornutrypeta</i>), obaleči, píďalky, pilatky, pematušky a jiní motýli

(Argyrotaenia, Eriopsela, Eupithecia, Ourapteryx, Leioptilus, Pachyprotasis, Cucullia)

Doporučený spon pro výsad.. v zapojených parkových výsadbách 2-3 rostliny na m2

Množení

Množení	Předpěstování sadby, Vrcholové řízky, Dělení trsů a Množení oddělky
Množení - poznámka	osivo (1 g k dopěstování tisíce rostlin) vzchází na světle
Mezihrnky	3-4 cm buňky sadbovače pro zakořenění řízků
Konečné hrnky	9 cm (jediný zakořenělý řízek), 11-12 cm (tři řízky)
Retardace	ne
Květní tvorba	dlouhodobní rostliny, vernalizace 5°C po dobu 12-15 týdnů) podporuje květní tvorbu i tvorbu stolonů
Odrůdy	‘Ballerina’, ‘Gale’, ‘Stephanie Cohen’, ‘La Perle’, ‘Boule de Neige’ s plnými úbory

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [SK 1 a: záhon nejbliž zadního vchodu do... / ZF - O - Experimentální zahrada - záhony](#)
- [P 1: pole - záhon nejbliže státní silnice... / ZF - P - Experimentální zahrada - pole](#)

Ostatní

VBN statistiky 2010: 6.1 mil.prod.stonků s obratem 640 tis.eur posouvá řebříčky na 105.pozici mez řezanými květinami; r.2005 ještě 8.2 mil.prod.stonků s obratem přes 1.0 mil.eur; z toho A.ptarmica ‘Major’ jen 142 tis.stonků

Odkazy

- Hawke R. (1994): A performance report of cultivated Yarrows (Achillea). Plant Evaluation Notes, Chicago Bot.Garden 5:1-4
- <https://www.softsort.cz/app/#/taxon/382>

Grafické přílohy





