

Taxon *Cotinus coggygria* 'Royal Purple'

Název taxonu	<i>Cotinus coggygria</i> 'Royal Purple'
Vědecký název taxonu	<i>Cotinus coggygria</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	Scop.
Odrůda	'Royal Purple'
Český název	ruj obecná
Synonyma (zahradnický pou..	<i>Rhus cotinus</i> L.
Autor	Jana Mokričková (jana_mokri_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Cotinus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holartická květenná říše, Cirkumboreální oblast, Atlanticko-eurosibiřská oblast, Makaronézáská oblast, Mediterránní oblast a Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - po..	Původ kultivaru: vyšlechtěn v roce 1911

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý keř opadavý
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	Opadavý, nepravidelně a široce větvený keř až vícekmenný strom, střeň rostoucí, roční přírůstek je 20 až 30 cm, výška kolem 20. roku po výsadbě 2 až 3 m, v 50. letech dosahuje v našich podmínkách výšky 4 až 5 m
Výhony	obloukovitě odstávající, lysé
Pupeny	střídavé
Listy	okrouhlé, až vejčité, střídavé, opadavé, při rašení jsou listy výrazně fialově-červené, později sytě fialové, v polostínu je vybarvení málo výrazné
Květenství	vrcholové laty, 10 -30 cm dlouhé
Květy	malé, žlutozelené či zelenavě bílé, 2-3 mm v průměru
Plody	malé, suché, šikmo obvejčité peckovice

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červen
Konec doby kvetení	Červenec

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	ve stínu listy méně vybarvují do vínova a zůstávají hnědavě zelené
Faktor tepla	Zóna 5 (do - 29 °C)
Faktor vody	prospívá na suchých až mírně vlhkých půdách, snáší přísušky
Faktor půdy	na půdy nenáročný, pH neutrální až zásadité
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	nevysazovat na silně vápenité půdy

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Řez	odstraňování slabých výhonů, při bujném růstu provádíme radikální zmlazení - řez silných větví u země
-----	---

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetickéh...	v průběhu vegetace
Použití	okrasný keř - solitera, skupinové výsadby, volně rostoucí i tvarované živé ploty, mobilní zeleň

Množení

Množení	Řízkování, Bylinné řízky, Polovyzrálé řízky a Roubování
Množení - poznámka	těžce množitelný druh, nejpoužívanějším způsobem množení je množení kultivaru je bylinnými řízků, doporučuje se používat stimulantů ve formě roztoků s IBA o koncentraci 1000 -3000 ppm, odběr řízků v červnu, možné je také množení z dřevitých řízků s použitím práškových stimulantů, nebo roubování na semenáče původního druhu

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [M 1 a: záhon vpravo od příjezdové cesty po... / ZF - M - Mendeleum \(Matečnice\)](#)

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš... 2008

Odkazy

- www.databaze.dendrologie.cz,
- <http://www.openbaargroen.be>

- [, Hatch, L. Cultivars of Woody Plants Volume I \(A-G\). TCR Press, 2007. 1031 p. ISBN 0971446504.](#)