

# Taxon Brassica oleracea var. gongylodes

Název taxonu	Brassica oleracea var. gongylodes
Vědecký název taxonu	Brassica oleracea var. gongylodes
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">L. DC.</a> , <a href="#">L. Markgr.</a>
Český název	kedlubna
Autor	Miloš Jurica (milo_jurica@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Druh</a>
Vnitrodruhové jednotky	convar. acephala var. gongylodes
Nadřazená kategorie	<a href="#">Brassica</a>

## Biogeografické regiony

---

Biogeografické regiony - po.. Středomoří

## Zařazení

---

Pěstitelská skupina Dvouletka pravá a Košťálová zelenina  
Zařazení podle původu, nár... pěstuje se pro osní hlízu

## Popisné a identifikační znaky

---

Habitus	tvar hlízy je kulovitý až ploše kulovitý
Kořen	nejslabší kořenový systém ze všech košťálovin
Listy	dlouze řapíkaté, na tenké bázi rozšířené, u báze řapíku je patrný žlábek, čepel mírně skadeřená, na okraji vroubkovaná, mírně laločnatá
Plody	dvoupouzdrá šešule s charakteristickým zobanem
Semena	kulovitá, tmavě hnědá, HTS 3,5 - 4,8 g
Vytrvalost	dvouletá

## Doba zrání

---

Začátek doby zrání Květen  
Konec doby zrání Říjen  
Doba zrání - poznámka sklizeň : Raná 15. V. - zač. VI., Letní VI. - VIII., Pozdní VIII. - X.

## Nároky na stanoviště

---

Faktor světla - slunce ✓  
Faktor tepla teplota předpěstování 14 - 17°C, následně 12 - 14°C  
Faktor půdy hlinité, hlinitopísčité naplaveniny s dostatkem humusu (4,5 a více procent)

## Užitné vlastnosti

---

Použití	zelenina
Choroby a škůdci	vyrová mozaika kvěťáku (Cauliflower mosaic virus - CaMV), bakteriální černá žilkovitost brukvovitých ( <i>Xantomonas campestris</i> pv. <i>campestris</i> ), nádorovitost brukvovitých (původce <i>Plasmodiophora brassicae</i> ), plíseň brukvovitých ( <i>Peronospora parasitica</i> ), alternáriová skvrnitost brukvovitých ( <i>Alternaria brassicicola</i> a <i>A. brassicae</i> ), květílka zelná ( <i>Delia radicum</i> ), mšice zelná ( <i>Brevicoryne brassicae</i> ), dřepčák ( <i>Phyllotreta</i> ssp.), krytonosec ( <i>Ceutorhynchus</i> ), bělásek zelný ( <i>Pieris brassicae</i> ), bělásek řepový ( <i>P. rapae</i> ), můra zelná ( <i>Mamestra brassicae</i> ), můra kapustová ( <i>Lacanobia oleracea</i> ), osenice polní ( <i>Agrotis segetum</i> ), záředníček polní ( <i>Plutella xylostella</i> ), molice vlašovičnicková ( <i>Aleyrodes proletella</i> ), bejlmorka zelná ( <i>Contarinia nasturtii</i> ), třásněnka ( <i>Trips</i> spp.)
Doporučený spon pro výsad..	raná 0,25 x 0,25 m, letní 0,3 - 0,4 x 0,3 - 0,4, pozdní 0,4 x 0,4 m

## Množení

---

Množení Přímý výsev a Předpěstování sadby

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [P 1: pole - záhon nejbliže státní silnice... / ZF - P - Experimentální zahrada - pole \(dle osevního postupu\)](#)