

# Taxon *Vitis labrusca* ruskij konkord

Název taxonu	Vitis labrusca ruskij konkord
Vědecký název taxonu	Vitis labrusca
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">Linné</a>
Odrůda	´Ruskij Konkord´ (RK)
Český název	réva liščí
Synonyma (zahradnický pou..	Ruskij Concord, Russia Concord, Ruskij Konkord
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Odrůda</a>
Nadřazená kategorie	<a href="#">Vitis</a>

## Biogeografické regiony

---

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	ruského původu, v roce 1910 ji získal I.V. Mičurin opylením americké odrůdy Concord ( <i>Vitis labrusca</i> ) pylem Amurské révy ( <i>Vitis amurensis</i> )

## Zařazení

---

Pěstitelská skupina	Mošťová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

## Popisné a identifikační znaky

---

Habitus	středně bujný až bujnější růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné, kaštanově hnědé, dobře vyžrávající
Pupeny	menší, zahrocené
Listy	středně velké až velké, pavézovité, trojlaločnaté, většinou s mírnými horními výkroji, bazální výkroj je tvaru písmene V, uzavřený; povrch vrásčitý, vespod jemně plstnatý
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	menší až středně velký, spíše válcovitý hrozen, křídlatý, volnější; bobule je středně velká, kulatá, fialově růžová
Semena	středně velká, hruškovitá, s kratším zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

## Doba kvetení

---

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

## Doba zrání

---

Začátek doby zrání	Září
Konec doby zrání	Říjen

## Nároky na stanoviště

---

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění
Faktor tepla	teplé polohy, mrazuvzdornost dobrá
Faktor vody	méně vhodné jsou příliš suché a vápenité půdy
Faktor půdy	úrodnější hlinité či hlinitopísčité půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	ovlivňujeme podnoží

## Agrotechnické vlastnosti a požadavky

---

Vhodnost vedení	vysoké i střední vedení
Řez	na dlouhý tažeň, snáší dobře i krátký řez
Podnož	do horších půdních podmínek Kober 125 AA i 5 BB, do úrodnějších půd CR 2 i SO 4

## Užitné vlastnosti

---

Použití	bílá moštová až stolní odrůda - výroba burčáku i lehčího bílého vína, rosé, přímý konzum
Choroby a škůdci	střední až vyšší odolnost k houbovým chorobám
Plodnost	pozdní, pravidelná (výnos 8-12 t/ha)

## Množení

---

Množení	Roubování
Množení - poznámka	dá se množit i hřížením, dřevitými řízkami i mikropropagací
Popis vína	víno je slaběji rubínově červené, s vůní jehličí až limetky, s vyšší kyselinkou
Doporučená technologie vína	burčák, stolní, jakostní a přívlastková vína, kupáže

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [V / ZF - V - vinice \(řádek 128\)](#)

## Grafické přílohy

---

