

Taxon *Vitis labrusca* ruskij konkord

Název taxonu	<i>Vitis labrusca</i> ruskij konkord
Vědecký název taxonu	<i>Vitis labrusca</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	´Ruskij Konkord´ (RK)
Český název	réva liščí
Synonyma (zahradnický pou..	Ruskij Concord, Russia Concord, Ruskij Konkord
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	ruského původu, v roce 1910 ji získal I.V. Mičurin opylením americké odrůdy Concord (<i>Vitis labrusca</i>) pylem Amurské révy (<i>Vitis amurensis</i>)

Zařazení

Pěstitelská skupina	Mošťová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	středně bujný až bujnější růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné, kaštanově hnědé, dobře vyžrávající
Pupeny	menší, zahrocené
Listy	středně velké až velké, pavézovité, trojlaločnaté, většinou s mírnými horními výkroji, bazální výkroj je tvaru písmene V, uzavřený; povrch vrásčitý, vespod jemně plstnatý
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	menší až středně velký, spíše válcovitý hrozen, křídlatý, volnější; bobule je středně velká, kulatá, fialově růžová
Semena	středně velká, hruškovitá, s kratším zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání	Září
Konec doby zrání	Říjen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění
Faktor tepla	teplé polohy, mrazuvzdornost dobrá
Faktor vody	méně vhodné jsou příliš suché a vápenité půdy
Faktor půdy	úrodnější hlinité či hlinitopísčité půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	vysoké i střední vedení
Řez	na dlouhý tažeň, snáší dobře i krátký řez
Podnož	do horších půdních podmínek Kober 125 AA i 5 BB, do úrodnějších půd CR 2 i SO 4

Užitné vlastnosti

Použití	bílá moštová až stolní odrůda - výroba burčáku i lehčího bílého vína, rosé, přímý konzum
Choroby a škůdci	střední až vyšší odolnost k houbovým chorobám
Plodnost	pozdní, pravidelná (výnos 8-12 t/ha)

Množení

Množení	Roubování
Množení - poznámka	dá se množit i hřížením, dřevitými řízkami i mikropropagací
Popis vína	víno je slaběji rubínově červené, s vůní jehličí až limetky, s vyšší kyselinkou
Doporučená technologie vína	burčák, stolní, jakostní a přívlastková vína, kupáže

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [V / ZF - V - vinice \(řádek 128\)](#)

Grafické přílohy

