

Taxon Clematis 'Dr Ruppel'

Název taxonu	Clematis 'Dr Ruppel'
Vědecký název taxonu	Clematis
Jména autorů, kteří taxon p...	Charles Noble
Odrůda	'Dr. Ruppel'
Český název	plamének
Autor	Jana Mokričková (jana_mokri_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Ranunculaceae

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po.. Intro Dr. Ruppel, 1975, Argentina

Zařazení

Pěstitelská skupina	Liána opadavá
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	výška 1,5 - 3 m, popínavý, kompaktný
Výhony	tenké, hnědé, plstnatě chlupaté, hranaté, starší lysé, internodia dutá, starší dřevo na příčném řezu nápadně pórovité
Pupeny	vstříčné, malé, kuželovité, hustě bíle plstnaté, umístěné těsně pod ovíjivým vytvářejícím řapíkem
Listy	řapíkaté, lichospeřené, po 3-5 lístků, s úponkovitými řapíky
Květenství	laty
Květy	Tm. růžové s karmínovým pruhem v centru sepálu, prašníky nahnědlé, v průměru 15 cm
Plody	nažka s pérnatou čnělkou, velmi atraktivní
Kůra a borka	hnědá

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen
Remontování	✓
Remontování - poznámka	VIII-IX

Nároky na stanoviště

Faktor světla světlomilný,

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - stín	✓
Faktor světla - poznámka	světломilný, vyžadují však přistínění kořenů
Faktor tepla	mrazuvzdorný, jen v tuhých zimách poškozovány mrazem, Zóna 5 - 7
Faktor vody	vlhko, ne však příliš zamokřené půdy
Faktor půdy	neutrální - mírně zásadité, vhodné jsou živné, ne těžké půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Řez kvete na bočních výhonech ložského dřeva, a na konci léta na vrcholech nových výhonů, proto na začátku jara ponechat jen silné výhony seříznuté k páru silných pupenů cca 150 cm dlouhých

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	léto - výrazné květy
Použití	okrasný keř - skupiny, solitera, trvalkové záhony, vyžaduje oporu
Choroby a škůdci	Vadnutí Plaménku (Phoma clematidina): Rychlé odumírání listů, celých výhonů i rostlin. Padlí (Erysiphe polygoni): Bělavý povlak na listech měkkých výhonech i květech. Plíseň šedá (Botrytis cinerea): Poupata, květní stopky i stonky hnědnou, hnědý povlak plísně. Antraknoza Plaménku (Matssonina clematidis): Tmavěhnědé až černé skvrny často se šíří od čepele až podél středu listu. Mšice, Slimáci.

Množení

Množení	Řízkování, Polovyzrálé řízky, Dřevité řízky, Hřížení a Roubování
Množení - poznámka	v současné době je nejvíce rozšířeno pro kultivary rodu Clematis řízkování zelenými řízkami, na řízku ponecháváme min. 1 pár listů, řízky s bočním poraněním, méně rozšířenou metodou je robování, jako podnože je možno využít <i>C. viticella</i> L. eventuelně <i>C. vitalba</i> L.

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [M 1 a: záhon vpravo od příjezdové cesty po... / ZF - M - Mendeleum \(Matečnice\)](#)

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš... 2009

Poznámka matečná rostlina - rostliny jsou každoročně zmlazovány řezem (cca 30 cm nad zemí)

Odkazy

- <http://www.clematisinternational.com>
- <http://www.guernsey-clematis.co.uk>
- <http://www.parkon.cz>
- <http://www.databaze.dendrologie.cz>
- <http://www.clematis.hull.ac.uk>