

Taxon *Vitis vinifera* Dunaj

Název taxonu	Vitis vinifera Dunaj
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	´Dunaj´ (Du)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	MBOPSV 6/10
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	jedná se o slovenskou odrůdu, vznikla křížením odrůd (´Muscat Bouschet´ x ´Oporto´) x ´Svatovavřínecké´

Zařazení

Fytcenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Mošťová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	dle vedení, má středně bujný až slabší růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné, tmavě hnědé, dobře vyzrávající
Pupeny	středně až velké, tupé
Listy	středně velké, okrouhlé, hluboce vykrajované, bazální výkroj je lyrovitý s průsvitem; povrch listu je světle zelený, jemně vrásčitý
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	středně velký hrozen, křídlatý, spíše hustší; má středně velké kulaté bobule, tmavě modré barvy
Semena	menší, hruškovité, s krátkým zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání	Září
Konec doby zrání	Září

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění
Faktor tepla	teplé polohy, mrazuvzdornost dobrá
Faktor vody	vhodné jsou sušší i kamenité půdy
Faktor půdy	hlinité, hlinitopísčité půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	střední vedení
Řez	na dlouhý tažeň, snáší však i krátký řez
Podnož	na chudších půdách Kober 125 AA, do hlubších a úrodnějších půd pak CR 2 nebo SO 4

Užitné vlastnosti

Použití	modrá moštová odrůda - výroba červeného vína
Choroby a škůdci	odolnost proti houbovým chorobám je střední, citlivější je na padlí révové
Plodnost	středně pozdní, pravidelná (výnos 9-12 t/ha)

Množení

Množení	Roubování
Množení - poznámka	dá se množit i hřížením, dřevitými řízkami i mikropropagací
Popis vína	víno je tmavočervené barvy, s jemnou příjemnou kabinetovou chutí
Doporučená technologie vína	jakostní a přívlastková červená vína i rosé

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	<ul style="list-style-type: none">V / ZF - V - vinice (řádek 114)
--------------------------	---

Ostatní

Odkazy	<ul style="list-style-type: none">http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf
--------	---

Grafické přílohy

