

# Taxon *Prunus subhirtella*

Název taxonu	Prunus subhirtella
Vědecký název taxonu	Prunus subhirtella
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">Miq.</a>
Český název	višeň chloupkatá
Synonyma (zahradnický pou..	Cerasus herincquiana Lav.
Autor	Přemysl Krejčířík (p_emysl_krej_i_k@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Druh</a>
Nadřazená kategorie	<a href="#">Prunus</a>

## Biogeografické regiony

---

Biogeografické regiony Holartická květenná říše a Cirkumboreální oblast

## Zařazení

---

Pěstitelská skupina	Listnatý strom opadavý a Listnatý keř opadavý
Pěstitelská skupina - pozná..	strom někdy jen keř
Životní forma	Fanerofyt

## Popisné a identifikační znaky

---

Habitus	strom, někdy jen keř, 5-8(15) m vysoký; koruna široce kulovitá
Výhony	chlupaté
Pupeny	tmavě hnědé
Listy	vejčité nebo podlouhle vejčité, 3 - 8 cm dlouhé s 10 páry nervů, často dvojitě pilovité, na rubu na nervedech pýřité; řapík chlupatý
Květenství	okolíky s malými listeny
Květy	18 mm v průměru světle růžové, uspořádané v okolících po 2 - 5, korunní plátky elipčité, rozštěpené, číška džbánkovitá, stopky chlupaté; nevoní
Plody	dužnaté peckovice, 8 mm v průměru, kulovité, purpurově černé
Kůra a borka	tmavá
Možnost záměny taxonu (+..	Prunus x yedoensis (korunní plátky široce elipčité, rozštěpené, kališní plátky přitisklé ke korunce)
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

## Doba kvetení

---

Začátek doby kvetení	Duben
Konec doby kvetení	Duben
Doba kvetení - poznámka	kvete v dubnu před olistěním

## Nároky na stanoviště

---

Faktor světla	vhodné stanoviště je slunce až lehký stín
Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor tepla	oblasti I-II
Faktor vody	půdy středně vlhké až mírně suché
Faktor půdy	vyhledává hlubší propustné půdy

## Užitné vlastnosti

---

Použití - pro trvalky	OPD - Okraj porostu dřevin a VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin)
Použití	solitéra, okraje skupin i stromořadí
Růstové i jiné druhově spec..	příkrásně kvete, plnokvěté odrůdy neplodí

## Množení

---

Množení	Předpěstování sadby, Množení oddělky, Očkování a Roubování
Množení - poznámka	kulturní odrůdy se množí roubováním nebo očkováním, často roubovaná na Prunus avium
Odrůdy	´Autumnalis´ - stromek do 5 m výšky; květy bílé, poloplné, kvete podle teploty od listopadu až do března (května); ´Elfenreigen´ - větve vzpřímené; listy při rašení hnědavé, květy bílé, hvězdčité - korunní jsou plátky úzké; ´Pendula´ - koruna deštníkovitá, větvičky převislé; květy jednoduché, růžové, 2 cm široké

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [Park - Růžový rybník a za turbínou / Zámecký park v Lednici](#)