# Taxon Potentilla fruticosa ´Abbotstwood´

| | |
|---|---|
| Název taxonu | Potentilla fruticosa ´Abbotstwood´ |
| Vědecký název taxonu | Potentilla fruticosa |
| Jména autorů, kteří taxon p... | L. |
| Odrůda | ´Abbotstwood´ |
| Český název | mochna křovitá |
| Synonyma (zahradnicky pou.. | Dasiphora fruticosa |
| Autor | Jana Mokričková (jana_mokri_kov_@unknown.cz) |
| Kategorie | Odrůda |
| Nadřazená kategorie | Potentilla |

## Biogeografické regiony

| | |
|---|---|
| Biogeografické regiony | Holarktická květenná říše |
| Biogeografické regiony - po.. | Původ kultivaru: byl vyšlechtěn Fredem Tustinem, Abbotswood, Anglie před rokem 1960 |

## Zařazení

| | |
|---|---|
| Pěstitelská skupina | Listnatý keř opadavý |
| Životní forma | Fanerofyt |

## Popisné a identifikační znaky

| | |
|---|---|
| Habitus | Drobný, opadavý, pomalu rostoucí, rozložitý keř, dosahuje v 10 letech výšky 0,6 až 0,8 m a šířky 0,9 až 1,2 m |
| Výhony | letorosty obvykle zprvu chlupaté |
| Pupeny | střídavé |
| Listy | opadavé, listy 3–7četné, tuhéjasně až stříbřitě zelené, lichozpeřené, složené většinou z 5 lístků, délka listu 1,5 - 2,2 cm |
| Květenství | jednotlivě nebo v koncových latách nebo vrcholících, vrcholové po 1 až několika |
| Květy | bílé se žlutými tyčinkami |
| Plody | chlupaté nažky |
| Kůra a borka | hnědočervená až hnědá |

## Doba kvetení

| | |
|---|---|
| Začátek doby kvetení | Červen |
| Konec doby kvetení | Srpen |

## Nároky na stanoviště

| | |
|---|---|
| Faktor světla - slunce | ✓ |
| Faktor světla - polostín | ✓ |
| Faktor světla - poznámka | Pro bohaté kvetení vyžaduje plné slunce nebo jen slabý stín |
| Faktor tepla | Zóna 3 (- 40 °C) |
| Faktor vody | vyžaduje běžnou půdu, raději propustnější a přiměřeně vlhko |
| Faktor půdy | nenáročná, roste v běžné zahradní půdě, pH slabě kyselé až slabě alkalické |
| Faktor půdy - poznámka | na suchých nebo silně alkalických půdách trpí chlorózou |

## Agrotechnické vlastnosti a požadavky

| | |
|---|---|
| Řez | pro pravidelné a bohaté kvetení je vhodné rostliny průběžně zmlazovat, snáší dobře i hluboké zmlazení |

## Užitné vlastnosti

| | |
|---|---|
| Období hlavního estetickéh... | období v květu |
| Použití | okrasný keř - solitera, skupiny, zejména však plošné zahuštěné výsadby jako půdní pokryv, vhodný pro nízké volně rostoucí živé plůtky a obruby, pro osázení mobilních nádob |

## Množení

| | |
|---|---|
| Množení | Řízkování, Bylinné řízky a Polovyzrálé řízky |
| Množení - poznámka | nejpoužívanější způsob je množení bylinnými řízky odebíranými v období června, doporučuje se použít rovněž stimulátor o 1000 ppm IBA |

## Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- M 1 a: záhon vpravo od příjezdové cesty po... / ZF - M - Mendeleum (Matečnice)

## Ostatní

| | |
|---|---|
| Výsev/výsadba na stanoviš... | 2009 |
| Odkazy | |

- www.databaze.dendrologie.cz,
- http://www.openbaargroen.be
- , Hatch, L. Cultivars of Woody Plants Volume I (A-G). TCR Press, 2007. 1031 p. ISBN 0971446504,