

Taxon *Vitis vinifera* Bouvier

Název taxonu	<i>Vitis vinifera</i> Bouvier
Vědecký název taxonu	<i>Vitis vinifera</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Odrůda	´Bouvierův hrozen´ (BH)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnicky pou..	Bouvier, Bouvierovo hrozno, Bouvier blanc, Radgonska ranina
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	Vitis

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	místo původu je nejisté, vznikla pravděpodobným spontánním křížením odrůd ´Rulandské bílé´ a ´Sylvánské zelené´

Zařazení

Fytcenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Moštová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	dle vedení, má středně bujný růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné, světle hnědé, dobře vyzrávajících
Pupeny	malé, tupé
Listy	středně velký, pětilaločnatý s hlubokými překrytými lyrovitými výkroji, bazální výkroj je lyrovitý s průsvitem; povrch listu je tmavě zelený, slabě puchýřnatý
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	malý, válcovitý, řidší hrozen; bobule středně velká, kulatá, žlutozelená
Semena	středně velká, hruškovitá, s krátkým a tupým zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano

Doba rašení Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení Květen

Konec doby kvetení Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání Srpen

Konec doby zrání Zář

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce ✓

Faktor světla - poznámka vyžaduje kvalitní oslunění

Faktor tepla teplé polohy, mrazuvzdornost dobrá

Faktor vody dobře snáší i suché a písčité půdy

Faktor půdy nejlépe hlinitopísčité humóznější půdy

Faktor půdy - vápnomilný ✓

Faktor půdy - poznámka ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení střední vedení

Řez na dlouhý tažeň, snáší však i krátký řez

Podnož na chudších půdách Kober 125 AA i 5 BB, do hlubších a úrodnějších půd pak SO 4 i T 5C

Užitné vlastnosti

Použití bílá moštová odrůda - výroba bílého vína, burčák

Choroby a škůdci nízká odolnost k houbovým chorobám, citlivá zejména na plíseň šedou

Plodnost raná, nižší ale pravidelná (výnos 6-8 t/ha)

Množení

Množení Roubování

Množení - poznámka dá se množit i hřížením, dřevitými řízkami i mikropropagací

Popis vína víno s nižším obsahem kyselin, vůně i chuť je jemně kořenitá lehce do muškátů

Doporučená technologie vína burčák, jakostní a přívlastková bílá vína

Celky sbírek

- [V / ZF - V - vinice \(řádek 132\)](#)

Grafické přílohy

