

# Taxon *Hydrangea paniculata*

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Název taxonu                   | Hydrangea paniculata                    |
| Vědecký název taxonu           | Hydrangea paniculata                    |
| Jména autorů, kteří taxon p... | <a href="#">Siebold</a>                 |
| Odrůda                         | 'Baby Lace''                            |
| Český název                    | hortenzie latnatá                       |
| Autor                          | Miloš Pejchal (milo_pejchal@unknown.cz) |
| Kategorie                      | <a href="#">Druh</a>                    |
| Nadřazená kategorie            | <a href="#">Hydrangea</a>               |

## Biogeografické regiony

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Biogeografické regiony        | Cirkumboreální oblast, Iránsko-turanská oblast a Čínsko-japonská oblast |
| Biogeografické regiony - po.. | Čína, Japonsko, Sachalin  |

## Zařazení

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Pěstitelská skupina           | Listnatý strom opadavý a Listnatý keř opadavý |
| Pěstitelská skupina - pozná.. | zpravidla vícekmínkové stromky                |
| Životní forma                 | Fanerofyt                                     |

## Popisné a identifikační znaky

|            |   |
|------------|---|
| Habitus    | nižší, zpravidla vícekmínkové stromky, v domovině až 7 m, u nás 2-3 m   |
| Výhony     | letorosty zprvu přitiskle pýřité  |
| Pupeny     | vstříčné nebo po 3  |
| Listy      | listy eliptické až vejčité, 5-15 cm, na rubu podél žilek přitiskle štětinatě chlupaté, okraj drobně pilovitý, vrcholek špičatý, až zašpičatělý, řapíky 10-25 cm |
| Květenství | kuželovitá lata 7-25 cm   |
| Květy      | sterilní květy bílé, později růžové, fertilní květy žlutavě bílé  |
| Plody      | elipsoidní tobolka, 3-4 mm  |

## Doba kvetení

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Začátek doby kvetení | Srpen |
| Konec doby kvetení   | Srpen |

## Nároky na stanoviště

Faktor světla - polostín ✓

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Faktor světla - poznámka   | mírný stín                       |
| Faktor tepla               | teplomilná, oblast, I-II, namrzá |
| Faktor vody                | střední vlhko                    |
| Faktor půdy                | půdy živnější, kyselé            |
| Faktor půdy - vápnostřežný | ✓                                |

## Užitné vlastnosti

---

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Období hlavního estetického... | VIII - květ   |
| Použití                        | použití rozmanité od rodinných zahrad po sadové úpravy, soliterně, ve skupinách nebo jako volný živý plot |

## Množení

---

|                    |  |
|--------------------|--|
| Množení            | Předpěstování sadby, Řízkování, Polovyzrálé řízky a Roubování  |
| Množení - poznámka | výsev osiva má význam jen při množení čistých druhů a pro šlechtění, hlavním způsobem je řízkování (řízky odebíráme v červnu a srpnu)H paniculata 'Grandiflora' množíme výhodně roubováním na kořeny                                     |
| Odrůdy             | Grandiflora' - velké keře kvetoucí ve středním a pozdním létě, až 2,5 m vysoké; tmavě krémově růžové květy v širokých kuželovitých latách, 'Praecox' - velké keře kvetoucí na počátku VII; květenství jsou zploštělé laty až 20 cm velké |