

Taxon *Vitis vinifera Arkadia krasnaja*

Název taxonu	<i>Vitis vinifera Arkadia krasnaja</i>
Vědecký název taxonu	<i>Vitis vinifera</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	<u>Linné</u>
Odrůda	‘Arkadia rozovaja’ (AR)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	<i>Arkadia krasnaja</i> , Tip Chadžibeja
Autor	Petra Bábíková (petra_b_b_kov_@unknown.cz)
Kategorie	<u>Odrůda</u>
Vnitrodruhové jednotky	<i>vinifera</i>
Nadřazená kategorie	<u><i>Vitis</i></u>

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	jde o ruskou odrůdu, vznikla křížením odrůd ‘Moldova’ x ‘Cardinal’

Zařazení

Fytocenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Liána opadavá
Pěstitelská skupina - pozná..	stolní odrůda révy
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	má středně bujný růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné až silné, kaštanově hnědé, dobře vyzrávající
Pupeny	středně velké, širší, tupé
Listy	středně velké, většinou trojlaločnaté s velmi mírnými výkroji, řapíkový výkrojek je lyrovitý, uzavřený; povrch listu je mírně vrásčitý
Květenství	lata
Květy	obouphlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	velký, kuželovitý, středně hustý hrozen; bobule je velmi velká, oválná, růžovofialové barvy
Semena	velká, s delším zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
----------------------	--------

Konec doby kvetení Červen

Doba zrání

Začátek doby zrání Srpen
Konec doby zrání Září

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí) teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost dobrá
Faktor tepla	
Faktor vody	suché písčité půdy jsou nevhodné
Faktor půdy	hlinité či hlinitopísčité půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	ovlivňujeme podnoží

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	střední i vysoké vedení
Řez	na dlouhý tažeň
Podnož	na chudších půdách Kober 125 AA či 5 BB, do hlubších a úrodnějších půd pak CR 2 i SO 4

Užitné vlastnosti

Použití	stolní odrůda - přímý konzum
Choroby a škůdci	středně odolná k houbovým chorobám, odolnější k mrazu
Plodnost	ranější, pravidelná (výnos 5-9 t/ha)

Množení

Množení	Roubování
Množení - poznámka	dá se množit i hržením, dřevitými řízkami i mikropropagací
Popis vína	dužnina bobule je masitá, v ústech rozplývavá, neutrální chuti

Celky sbírek

- Celky sbírek v areálu ZF
- [V / ZF - V - vinice \(řádek 133\)](#)

Ostatní

- Odkazy
- http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf

Grafické přílohy

