

Taxon Cotoneaster lucidus

Název taxonu	Cotoneaster lucidus
Vědecký název taxonu	Cotoneaster lucidus
Jména autorů, kteří taxon p...	Schltdl.
Český název	skalník lesklý
Autor	Miloš Pejchal (milo_pejchal@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Cotoneaster

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Arktická oblast, Cirkumboreální oblast a Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - po..	východní Sibiř

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý keř opadavý
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	opadavý vystoupavý keř s polopřevislými větvemi, výška až 3 m
Výhony	letorosty zprvu chlupaté a zelenavě šedé až kaštanové
Pupeny	většinou dvouřadě
Listy	listy vejčité až vejčitě eliptické, 2-7 cm, špičaté, leskle zelené a svrchu téměř lysé, rub řídce chlupatý, nakonec celé lysé
Květenství	plochá lata po 3-12 květech
Květy	bílé s růžovým nádechem
Plody	černé, kulovitě vejčité, neojíněné, 8 - 10 mm velké

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor tepla	I-III
Faktor vody	snese suché půdy
Faktor půdy	nenáročný
Faktor půdy - vápnomilný	✓

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	vegetační sezóna
Použití	skupiny keřů, netvarované živé ploty

Množení

Množení	Řízkování, Bylinné řízky a Polovyzrálé řízky
---------	--