

# Taxon *Acer tataricum* ssp *ginnala*

Název taxonu	<i>Acer tataricum</i> ssp <i>ginnala</i>
Vědecký název taxonu	<i>Acer tataricum</i> ssp. <i>ginnala</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">(Maxim.) Maxim.</a>
Český název	javor <i>ginnala</i>
Autor	Přemysl Krejčířík (p_emysl_krej_i_k@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Poddruh</a>

## Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Íránsko-turanská oblast a Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - po..	pobřežní křoviny a horské doliny

## Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý keř opadavý
Životní forma	Fanerofyt

## Popisné a identifikační znaky

Habitus	široký, někdy až stromkovitý keř s několika kmínky, výška 3-10 m, koruna nad zemí rozložitá
Výhony	mladé výhony jsou lysé, sivozelené nebo červenavé, později hnědé
Pupeny	šupiny pupenů na bázi červenavé, jinak černé
Listy	3laločné, 4-10 cm dlouhé, 3-6 cm široké, střední lalok mnohem delší než postranní, ostře a krubě 2x pilovité, líc tmovozelený, lesklý, lysý, rub světle zelený, lysý, řapík 1-5 cm
Květenství	vzpřímené laty
Květy	žlutobílé, vonné
Plody	nažky asi 2,5 cm dlouhé, s křídly téměř rovnoběžnými nebo až v ostrém úhlu rozevřenými
Kůra a borka	borka je tenká, temně šedohnědá, hladká a na povrchu rozpraskaná u starých rostlin
Možnost záměny taxonu (+..	<i>Acer tataricum</i> (matné, nemá laločnaté listy)

## Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka	kvete v květnu po olistění
-------------------------	----------------------------

## Doba zrání

Začátek doby zrání	Srpen
Konec doby zrání	Září

## Nároky na stanoviště

---

Faktor světla	světломilný, ale snese i přistínění
Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor tepla	mrazuvzdorný, oblasti I-III
Faktor vody	daří se mu lépe ve vlhkých humózních půdách ale roste i na sušších stanovištích
Faktor půdy	preferuje humózní půdy, hlinité, propustné

## Užitné vlastnosti

---

Období hlavního estetického...	při rašení a na podzim se listy barví do červena
Použití - pro trvalky	PD - Porost dřevin, OPD - Okraj porostu dřevin, VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin) a VPz - Volné plochy záhonového charakteru
Použití	celkem nenáročná dřevina, která je poměrně často vysazována do veřejné zeleně či do zahrad, do skupin, solitéra
Choroby a škůdci	obvykle netrpí škůdci
Růstové i jiné druhově spec..	snáší exhalace, velmi dobře snáší řez

## Množení

---

Množení	Přímý výsev, Řízkování, Dřevité řízky, Očkování, Očkování - Na bdící očko, Roubování a Roubování - Kopulace
Množení - poznámka	očkování a roubování především u kultivarů, očkování na zakořenělé podnože ve volné půdě, roubování ve volné půdě jen kopulací časně na jaře na rouby řezanými v prosinci
Odrůdy	Acer ginnala 'Aureo-variegatum', listy žlutopestré, Acer ginnala 'Red Wings', plody červené, zbarvují se již v květnu, velmi hezké, Acer ginnala 'Summer Splendor', plody jasně červené, hezké