

# Taxon *Potentilla fruticosa* 'Red Robin'

Název taxonu	<i>Potentilla fruticosa</i> 'Red Robin'
Vědecký název taxonu	<i>Potentilla fruticosa</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">L.</a>
Odrůda	'Red Robin'
Český název	mochna křovitá
Synonyma (zahradnický pou..)	<i>Dasiphora fruticosa</i>
Autor	Jana Mokričková (jana_mokri_kov_@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Odrůda</a>
Nadřazená kategorie	<a href="#">Potentilla</a>

## Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holartická květenná říše
Biogeografické regiony - po..	Původ kultivaru: vyšlechtěn Laddie deJong, Ireland

## Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý keř opadavý
Životní forma	Fanerofyt

## Popisné a identifikační znaky

Habitus	nízký, opadavý, rozložitý keř, dosahující výšky kolem 0,6 m a šířky 0,6 m
Výhony	letorosty obvykle zprvu chlupaté
Pupeny	střídavé
Listy	opadavé, listy 7četné, tuhé, tmavě zelené, lichozpeřené, délka listu 1,5 - 2,2 cm
Květenství	jednotlivě nebo v koncových latách nebo vrcholících, vrcholové po 1 až několika
Květy	jasně červené se žlutými tyčinkami, starší květy oranžově zbarveny, nevonné, 30 mm v průměru
Plody	chlupaté nažky
Kůra a borka	hnědočervená až hnědá

## Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červen
Konec doby kvetení	Srpen

## Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	vhodný polostín pro delší trvanlivost květů
Faktor tepla	Zóna 3 (- 40 °C)
Faktor vody	vyžaduje běžnou půdu, raději propustnější a přiměřeně vlhko
Faktor půdy	nenáročná, roste v běžné zahradní půdě, pH slabě kyselé až slabě alkalické
Faktor půdy - poznámka	na suchých nebo silně alkalických půdách trpí chlorózou

## Agrotechnické vlastnosti a požadavky

---

Řez pro pravidelné a bohaté kvetení je vhodné rostliny průběžně zmlazovat, snáší dobře i hluboké zmlazení

## Užitné vlastnosti

---

Období hlavního estetického... období v květu

Použití okrasný keř - solitera, skupiny, zejména však plošné zahuštěné výsadby jako půdní pokryv, vhodný pro nízké volně rostoucí živé plůtky a obruby, pro osázení mobilních nádob

## Množení

---

Množení Řízkování, Bylinné řízky a Polovyzrálé řízky

Množení - poznámka nejpoužívanější způsob je množení bylinnými řízky odebíranými v období června, doporučuje se použít rovněž stimulátor o 1000 ppm IBA

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [M 1 a: záhon vpravo od příjezdové cesty po... / ZF - M - Mendeleum \(Matečnice\)](#)

## Ostatní

---

Výsev/výsadba na stanoviš... 2009

Odkazy

- [www.databaze.dendrologie.cz](http://www.databaze.dendrologie.cz),
- <http://www.openbaargroen.be>
- [, Hatch, L. Cultivars of Woody Plants Volume I \(A-G\). TCR Press, 2007. 1031 p. ISBN 0971446504](#),
- [C. G. Davidson, POTENTILLA FRUTICOSA TAXONOMY AND INTERNATIONAL REGISTRATION, ISHS Acta Horticulturae 413:](#)

[II International Symposium on Taxonomy of Cultivated Plants,](#)

- <http://www.esveld.nl/voorraad/voorpotentilla.htm>