

Taxon *Chaenomeles x superba* 'Red Chief'

Název taxonu	<i>Chaenomeles x superba</i> 'Red Chief'
Vědecký název taxonu	<i>Chaenomeles x superba</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	(Frahm) Rehder
Odrůda	'Red Chief'
Český název	kdoulovec nádherný
Autor	Jana Mokričková (jana_mokri_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Chaenomeles

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po..	<i>Chaenomeles x superba</i> je kříženec <i>Chaenomeles japonica</i> a <i>Chaenomeles speciosa</i> . Původ kultivaru: Šlechtitel - p. Clarke, vyšlechtěna v roce 1953
-------------------------------	---

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý keř opadavý
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	Hustě větvený keř, větve pravidelně větvené, vzpřímený vzrůst, keř do 1,5 m vysoký
Výhony	se zkrácenými trnitě přeměněnými výhony, letorosty drsně plstnaté
Listy	listy intermediární, ale nejčastěji spíše podobné <i>Chaenomeles japonica</i> , jen užší a ostřeji pilovité, široce vejčité, drobnější, 3-5 cm dlouhé s ostrou špičkou, po vyrašení s bronzovým nádechem, později světle zelené, lesklé
Květenství	jednotlivě nebo ve svazečkách
Květy	v průměru 3,5 až 5 cm, jasně červené, plnokvěté
Plody	malvice jablkovitého tvaru
Semena	ve zralosti tmavě hnědá
Kůra a borka	hnědá

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Duben
Konec doby kvetení	Květen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor tepla	Zóna 5 (- 29 °C)
Faktor vody	nenáročná, snese suché půdy
Faktor půdy	na půdy nenáročný, slabě kyselá až neutrální, při vyšším obsahu vápníku se může na listech vyskytovat chloróza - žloutnutí listů

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Řez	dobře snáší řez - vhodný k tvarování, jinak řez nevyžaduje, řez se provádí v zimě (méně kvete), nebo lépe v červnu
-----	--

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	období v květu
Použití	okrasný keř - solitera, skupiny, živé ploty, tvarování

Množení

Množení	Řízkování, Bylinné řízky, Polovyzrálé řízky, Kořenové řízky, Množení odkopky a Roubování
Množení - poznámka	Nejpoužívanějším způsobem je bylinné řízkování, méně častým způsobem roubování kultivarů na původní druh, Crataegus nebo na Sorbus

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF	<ul style="list-style-type: none">• M 1 a: záhon vpravo od příjezdové cesty po... / ZF - M - Mendeleum (Matečnice - 10. řada)
--------------------------	---

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš...	2009
Odkazy	<ul style="list-style-type: none">• www.databaze.dendrologie.cz,• http://www.openbaargroen.be• , Hatch, L. Cultivars of Woody Plants Volume I (A-G). TCR Press, 2007. 1031 p. ISBN 0971446504.