

# Taxon *Akebia quinata*

Název taxonu	Akebia quinata
Vědecký název taxonu	Akebia quinata
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">(Houtt.) Decne</a>
Český název	akebie pětičetná
Autor	Miloš Pejchal (milo_pejchal@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Druh</a>
Nadřazená kategorie	<a href="#">Akebia</a>

## Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Íránsko-turanská oblast a Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - po..	střední Čína, Japonsko, Korea

## Zařazení

Pěstitelská skupina	Liána opadavá
Životní forma	Fanerofyt

## Popisné a identifikační znaky

Habitus	ovíjivý keř, 6-12 m vysoký
Výhony	fialově nachové letorosty
Pupeny	pupeny střídavě uspořádané, světle červenohnědé, kryté celokrajnými šupinami
Listy	listy dlanitě složené, (3-)5(-7)četné, s 4,5-10 cm dlouhým tenkým řapíkem, lístky eliptické až obvejčité, 3-6 cm dlouhé, celokrajné, na líci tmavě zelené, na rubu sivé s 1-2 cm řapíčky
Květenství	hrozen
Květy	purpurově hnědé, vonné, samičí 2-3 cm v průměru, samčí mnohem menší a světlejší
Opylovací poměry	Cizosprašná
Plody	plody 4-9 cm dlouhé, světle fialové, ojíňené, jedlé dužnaté měchýřky
Semena	černá, lesklá
Kůra a borka	větve lysé
Možnost záměny taxonu (+..	<i>A. trifoliata</i> - 3četné listy, lístky mělce vroubkované nebo na okraji zvlňené
Dlouhověkost	krátkověká dřevina
Doba rašení	Brzy na jaře rašící (II-III)

## Doba kvetení

---

Začátek doby kvetení	Duben
Konec doby kvetení	Květen

### Doba zrání

---

Začátek doby zrání	Červen
Konec doby zrání	Srpen
Doba zrání - poznámka	v našich podmínkách v září až v říjnu

### Nároky na stanoviště

---

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor tepla	v oblastech teplejšího klimatu je velmi přizpůsobivá a schopna snášet i stín a sucho, prospívá na celém území ČR mimo horské oblasti, plodí pouze v I. výrobní oblasti
Faktor vody	vlhké půdy
Faktor půdy	Daří se jí na dobře propustných vlhčích lehkých písčitéch, hlinitých, ale i jílovitých půdách, je indiferentní k pH

### Agrotechnické vlastnosti a požadavky

---

Vhodnost vedení	vysazujeme k opoře u zdi, besídky nebo pergoly, ale můžeme nechat plazit i po zemi bez opory
Řez	řez nevyžaduje

### Užitné vlastnosti

---

Období hlavního estetického účinku	období rašení - březen, duben, období kvetení - duben a květen, olistěním po celou dobu vegetace
Použití	pro popnutí pergol a jiných konstrukcí - jemnější úpravy
Choroby a škůdci	u nás netrpí ani chorobami ani škůdci

### Množení

---

Množení	Předpěstování sadby, Řízkování, Polovyzrálé řízky, Kořenové řízky a Hřížení
---------	---

### Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [M 1 a: záhon vpravo od příjezdové cesty po... / ZF - M - Mendeleum](#)
- [D 7: záhon před hlavním vchodem do budovy... / ZF - D -](#)

## **Ostatní**

---

Výsev/výsadba na stanoviš... VII/2020