

# Taxon *Ribes nigrum*

Název taxonu	<i>Ribes nigrum</i>
Vědecký název taxonu	<i>Ribes nigrum</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">L.</a>
Český název	rybíz černý, meruzalka černá
Autor	Miloš Pejchal (milo_pejchal@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Druh</a>
Nadřazená kategorie	<a href="#">Ribes</a>

## Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Cirkumboreální oblast, Atlanticko-eurosibiřská oblast a Iránsko-turanská oblast
Biogeografické regiony - po..	Evropa, střední Asie

## Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý keř opadavý
Životní forma	Fanerofyt

## Popisné a identifikační znaky

Habitus	velmi hustě větvený opadavý keř do 2 m výšky, až nepříjemně aromatický
Výhony	bez tmů, letorosty chloupkaté
Pupeny	střídavé
Listy	čepel listů téměř okrouhlá až ledvinitá, 40-100 mm velká, na rubu pýřitá a žlutě žláznatá, 3-5laločná, okraj nepravidelně hrubě pilovitý
Květenství	květy po 2-12 v řídkém nícím hroznu, až 8 cm
Květy	květy oboupohlavné, žlutavé, bělavě červené až šedofialové, 5-7 mm
Plody	plody černé, kulovité, asi 8-14 mm tlusté, jedlé bobule s vytrvalým kalichem

## Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Květen

## Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓

Faktor světla - stín	✓
Faktor světla - poznámka	slunce i stín
Faktor tepla	až 800 - 900 m. n. m.
Faktor vody	vlhčejší stanoviště
Faktor půdy	na půdu nenáročný

## Užitné vlastnosti

---

Období hlavního estetického...	V - květ, nevýrazný, léto - plody
Použití	do podrostu, ovocná dřevina
Choroby a škůdci	mšice

## Množení

---

Množení	Předpěstování sadby, Řízkování, Bylinné řízky, Dřevité řízky a Roubování
Množení - poznámka	výsev semen přichází v úvahu jen u čistého druhu, můžeme řízkovat, nebo roubovat na R. aureum