

Taxon *Pennisetum alopecuroides* var *viridescens*

Název taxonu	<i>Pennisetum alopecuroides</i> var <i>viridescens</i>
Vědecký název taxonu	<i>Pennisetum alopecuroides</i> var. <i>viridescens</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	(Miq.) Ohwi
Český název	dochan psárkovitý; vousatec
Synonyma (zahradnický pou..)	<i>Pennisetum alopecuroides</i> 'Moudry'
Autor	Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holartická květenná říše, Čínsko-japonská oblast a Australská květenná říše
Biogeografické regiony - po..	východní Asie - Japonsko, Čína, Korea, západní Austrálie

Zařazení

Fytocenologický původ	vlhké louky, světliny v lesích, podél vodních toků
Pěstitelská skupina	Trvalka zatahující
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus	vytváří pravidelné, úhledné, velmi elegantní trsy, vysoké 80 - 100 cm
Kořen	svazčitý kořen
Výhony	stébla silné, pevné, tmavě zelené
Listy	jemné, tmavě zelené, na okraji drsné, obloukovitě ohnuté, až 110 cm dlouhé, širokolistý typ
Květenství	dlouze osinaté válcovité lichoklasy připomínají štětku na čištění láhví. Jsou nápadně tmavě purpurovo fialové, krátké, umístěné těsně nad listy.
Květy	lichoklas s dlouhými osinami
Plody	obilka
Možnost záměny taxonu (+..)	podobný odrůd 'National Arboretum', která je vyšší a s květenstvím vysoko nad listy.
Dlouhověkost	středněvěká trvalka. Ideální je po 5 - 6 letech přemnožit - staré trsy hůře kvetou.
Doba rašení	Pozdně na jaře rašící (V)
Doba rašení - poznámka	raší velmi pozdě, až ve druhé polovině května

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Srpen
Konec doby kvetení	Říjen
Doba kvetení - poznámka	kvete od konce srpna

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	mírný polostín toleruje - hůře kvete, vytahuje se, méně nebo vůbec nevybarvuje do žluta na podzim
Faktor tepla	teplomilný taxon. V tuhých a mokřích zimách může vymrznout nebo vyhnívat. První rok po výsadbě vyžaduje ochranu. Do vyšších poloh nevhodný.
Faktor vody	svěží, vlhká půda. Mírně suché půdy toleruje, ale je slabšího růstu
Faktor půdy	živné, propustné půdy. V těžkých hlinitých půdách vyžaduje drenáž.

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Řez rostliny seřezáváme na jaře přibližně 10 cm nad povrchem půdy

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	od srpna do prosince.
Použití - pro trvalky	OPD - Okraj porostu dřevin, VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPP - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru, VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca), VPPv - Volné plochy vřesovištního charakteru (písčité půdy bez přítomnosti Ca), A - Alpinum, Z - Záhon a OV - Okraj vody
Použití - pro trvalky - pozná..	Velmi atraktivní tráva s tmavým květenstvím; solitéra, skupinové výsadby, výsadby do nádob
Použití	velmi široké uplatnění. Vhodná také k řezu a na sušení
Růstové i jiné druhově spec..	květenství se v zimě rozpadá
Doporučený spon pro výsad..	1 - 2 ks/m ²

Množení

Množení	Předpěstování sadby a Dělení trsů
Množení - poznámka	dělením trsů brzy na jaře

Celky sbírek

- [Z 1: záhon 1 / ZF - Z - Akademická zahrada \(Z5\)](#)

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš... 2011
Výsev/výsadba na stanoviš... založení akademické zahrady
Dodavatel Siebler Stauden

Grafické přílohy

