

Taxon *Colutea arborescens*

Název taxonu	<i>Colutea arborescens</i>
Vědecký název taxonu	<i>Colutea arborescens</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Český název	žanovec obecný, žanovec měchýřník
Autor	Miloš Pejchal (milo_pejchal@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Fabaceae

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Atlanticko-eurosibiřská oblast, Mediterránní oblast a Iránsko-turanská oblast
Biogeografické regiony - po..	jižní a střední Evropa, severní Afrika, západní Asie

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý keř opadavý
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	beztrnný, bohatě větvený, vzpřímeně rostoucí keř vysoký 1,5-4 m
Výhony	letorosty přitiskle chlupaté
Pupeny	střídavé
Listy	listy lichozpeřené, 4-16 cm, se 3-7 páry lístků, ty jsou nejčastěji široce eliptické až vejčité, 1-4 cm, rub je bělavě chlupatý
Květenství	hroznovité květenství po 2-8 květech
Květy	květy svítivě zlatožluté, pavéza červeně až červenohnědě pruhovaná
Plody	plod je měchýřkovitý lusk, 4-8 cm, načervenalý, nafouklý

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červen
Konec doby kvetení	Srpen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor tepla	oblast I-II, u nás konečky namrzají
Faktor vody	snese sucho

Faktor půdy chudé půdy

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	VI-VIII - květ
Použití	ne na exponovaná místa, okraje skupin, uplatní se v sídlištní zeleni a parkových úpravách, ale jsou jedovaté
Choroby a škůdci	netrpí

Množení

Množení	Předpěstování sadby, Očkování a Roubování
Množení - poznámka	čistý druh množíme semenem, kultivary očkujeme nebo roubujeme na druh původní