

Taxon *Exochorda racemosa*

Název taxonu	Exochorda racemosa
Vědecký název taxonu	Exochorda racemosa
Jména autorů, kteří taxon p...	(Lindl.) Rehder
Český název	hroznovec hroznatý
Synonyma (zahradnický pou..	E. grandiflora Lindl.
Autor	Miloš Pejchal (milo_pejchal@unknown.cz)
Kategorie	Druh

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Čínsko-japonská oblast
Biogeografické regiony - po..	východní Čína

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý keř opadavý
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	opadavý 2-4 m vysoký keř s rozkladitým vzrůstem
Výhony	letorosty červenohnědé, nakonec hnědé, s lenticelami, lysé
Pupeny	střídavé, tmavě purpurové a trojúhle vejcovité, lysé, tupé
Listy	listy podlouhlé až obvejčité, 3-8 cm, špičaté, celokrajné nebo v horní části pilovité, svrchu světle zelené, řapíky 5-15 mm
Květenství	vzpřímené hrozny po 6-12 květech
Květy	květy bílé, asi 3-4 cm široké, korunní lístky okrouhlé
Plody	pětípouzdrá tobolka vzniklá srůstem měchýřků

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	světlomilná, snese polostín
Faktor tepla	oblast I-II
Faktor vody	snese sucho
Faktor půdy	vyhovuje jí živná, propustná zahradní zemina

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického... V-VI - květ

Použití keř ozdobný květem, jako solitera i do skupin keřů

Množení

Množení Předpěstování sadby, Řízkování, Bylinné řízky a Hřížení