

# Taxon *Spiraea prunifolia*

Název taxonu	<i>Spiraea prunifolia</i>
Vědecký název taxonu	<i>Spiraea prunifolia</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">Siebold &amp; Zucc.</a>
Český název	tavolník třešňolistý
Autor	Jana Mokričková (jana_mokri_kov_@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Druh</a>
Nadřazená kategorie	<a href="#">Rosaceae</a>

## Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Čínsko-japonská oblast
------------------------	------------------------

## Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý keř opadavý
Životní forma	Fanerofyt

## Popisné a identifikační znaky

Habitus	graciózně stavěný keř, tenké větévky poloobloukovitě polopřevislé, kmínky v přízemní části vystoupavé, výška do 2–3 m
Výhony	letorosty tenké, dlouze metlovité, zprvu jemně chlupaté
Listy	čepel vejčitá, (podlouhle) eliptická až podlouhle kopinatá, 15–50 × 7–20 mm velká, oboustranně zprvu drobně pýřitá, svrchu olýsávající, báze klínovitá, okraj drobně pilovitý, vrcholek špičatý, na podzim oranžové až červenohnědé
Květenství	přisedlé okolíky, 3 - 6 květy
Květy	listeny 4–7 mm, stopky květů 10–24 mm, květy jednoduché nebo plné, 10–12 mm v průměru, sepaly 1.5–2 mm, petaly bílé, obvejčité nebo téměř okrouhlé, delší než sepaly
Plody	měchýřky pukající břišním švem
Semena	podlouhlá
Kůra a borka	borka tenká a světle šedá

## Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Duben
Konec doby kvetení	Květen

## Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce ✓

Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	špatně snáší horký a suchý úpal při letních vedrech
Faktor tepla	Zóna 4 (- 34 °C), ale poměrně brzy a raší a trpí pozdními mrazíky, poškozené větve dobře obrůstají ale kvetou až další rok, proto je důležitý výběr chráněné polohy nejlépe v závětří na jihozápad až západ
Faktor vody	nemá speciální nároky, ale má raději propustnou půdu
Faktor půdy	pH mírně kyselé až mírně zásadité, vyžaduje běžné zahradní půdy

## Agrotechnické vlastnosti a požadavky

---

Řez	řez po odkvětu, vhodné je také soustavné zmlazování pravidelným průklestem
-----	--

## Užitné vlastnosti

---

Období hlavního estetického...	v době květu, na podzim
Použití	okrasný keř - solitera, skupiny, zahuštěné výsadby v mírně svažitém terénu

## Množení

---

Množení	Řízkování, Bylinné řízky, Polovyzrálé řízky a Dřevité řízky
Množení - poznámka	nejčastější je množení řízkováním, za použití bylinných nebo dřevitých řízků

## Ostatní

---

Výsev/výsadba na stanoviš...	1977
------------------------------	------