

Taxon *Apium graveolens* var. *secalinum*

| | |
|--------------------------------|---|
| Název taxonu | <i>Apium graveolens</i> var. <i>secalinum</i> |
| Vědecký název taxonu | <i>Apium graveolens</i> var. <i>secalinum</i> |
| Jména autorů, kteří taxon p... | L.Alef. |
| Český název | celer naťový |
| Autor | Miloš Jurica (milo_jurica@unknown.cz) |
| Kategorie | Druh |
| Vnitrodruhové jednotky | var. <i>secalinum</i> |
| Nadřazená kategorie | Apium |

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po.. Středomoří

Zařazení

Pěstitelská skupina Dvouletka pravá a Kořenová zelenina
Pěstitelská skupina - pozná.. na konzum pěstovaná jako jednoletá, na semeno jako dvouletá
Zařazení podle původu, nár... pěstuje se pro listy

Popisné a identifikační znaky

| | |
|------------|---|
| Habitus | v prvním roce vytváří růžici listů, ve druhém roce 1,2- 1,5m vysoká květní lodyha |
| Listy | aromatické větší, lichozpeřené řapíkaté |
| Květenství | složený okolík |
| Květy | drobné, bílé |
| Plody | žebnatá dvounažka |
| Semena | HTS 0,3-0,5g |
| Vytrvalost | dvouletý |

Doba zrání

Doba zrání - poznámka sklizeň jednotlivých listů nebo celé rostliny

Nároky na stanoviště

| | |
|------------------------|--|
| Faktor světla - slunce | ✓ |
| Faktor vody | 650 mm srážek v době vegetačního období |
| Faktor půdy | hluboké humózní půdy, hlinité, vododržné, záhřevné |

Užitné vlastnosti

| | |
|-----------------------------|---|
| Použití | zelenina |
| Choroby a škůdci | srdéčkova hniloba celeru, virová mozaika celeru (Celery mosaic virus- CeMV), septoriová skvrnitost listů celeru (Septoria apiicola), Korkovitost bulev celeru (Phoma apiicola), háďatko severní (Meloidogyne hapla) |
| Doporučený spon pro výsad.. | 0,4 x 0,3 - 0,4 m |

Množení

Množení Předpěstování sadby

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [P 1: pole - záhon nejbliže státní silnice... / ZF - P - Experimentální zahrada - pole \(dle osevního postupu\)](#)