

Taxon *Malus domestica* 'Boskoopské červené'

Název taxonu	<i>Malus domestica</i> 'Boskoopské červené'
Vědecký název taxonu	<i>Malus pumila</i> var. <i>domestica</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	Borkh.
Odrůda	'Boskoopské červené'
Český název	jabloň obecná
Synonyma (zahradnický pou..	'Roter Boskoop'' , 'Roder Boskoop' , 'Boskoopskaja krasavica'
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Malus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po.. Nizozemí, Wardmannshof u Roos, 1856

Zařazení

Fytopcenologický původ pupenová mutace 'Reinette de Montfort'
Pěstitelská skupina Jádrovina

Popisné a identifikační znaky

Habitus	velká až velmi velká, široce kulovitá až rozložená koruna
Pupeny	listové pupeny jsou větší, širší, protáhle tupě zašpičatělé, přilehlé až mírně odstavující; květní pupeny jsou velké, kulaté, šedohnědé, slabě ochmýřené
Listy	větší až velké, asymetrické, široce eliptické až oválně vejčité, zašpičatělé, matné, naředle zelené
Květy	květy středně velké až velké, bílé, nepravidelně ploše talířovité, blizny na úrovni prašníků; vhodné opylovači jsou odrůdy 'James Grieve' , 'Summerred' , 'Idared' , 'Oldenburgovo' , 'Ontario'
Opylovací poměry	Cizosprašná
Plody	velké až velmi velké (150-200 g), ploše kulovité, často asymetrické, zelenožluté se rží, šťavnaté, velmi dobré
Možnost záměny taxonu (+..	Habitus růstu stromů, tvar listů a ostrost vroubkování jejich okraje, vzhled plodů, konzistence a chuť dužniny.

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka raná, od 4.-7. května do 16.-19. května

Doba zrání

Doba zrání - poznámka 5. - 15. října (skladování do března), zimní odrůda

Nároky na stanoviště

Faktor tepla malá mrazuodolnost ve dřevě i v květu; jen do úrodných půd, do teplých a chráněných stanovišť

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení vhodná jen pro volně rostoucí nebo větvenovitě zákrsky
Řez nenáročná
Podnož jen pro slabě rostoucí podnože (M 9)

Užitné vlastnosti

Použití konzum, transport
Choroby a škůdci málo náchylná k padlí a strupovitosti, často trpí hořkou skvrnitostí plodů, citlivá na mykoplazmózní proliferaci
Růstové i jiné druhově spec.. silný až velmi silný, bujný
Plodnost pozdní, dosti vysoká, ale nepravidelná

Množení

Množení Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování - Kopulace

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad \(Výsadba jabloní\)](#)

Ostatní

Poznámka Tato odrůda je stále ve světě ceněna a přes pozdější nástup plodnosti a střídavou plodnost i vzrůstnost se pěstuje a ovoce je vyhledáváno. Hodí se jen do úrodných půd a na teplá chráněná stanoviště.

Grafické přílohy

