

Taxon *Malus domestica* 'Sudetská reneta'

Název taxonu	<i>Malus domestica</i> 'Sudetská reneta'
Vědecký název taxonu	<i>Malus pumila</i> var. <i>domestica</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	Borkh.
Odrůda	'Sudetská reneta'
Český název	jabloň obecná
Synonyma (zahradnický pou..	'Jesenická reneta', 'Sudeten Renette', 'Reinette de Sudetes'
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Malus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po.. ČSR, Bludov, koncem 19. století

Zařazení

Fytocenologický původ	kříženec 'Ananasová reneta' x 'Kanadská reneta' x Gdáňský hranáč'
Pěstitelská skupina	Jádrovina

Popisné a identifikační znaky

Habitus	koruna je ploše kulovitá, v půdorysu značně nepravidelná, poměrně hustá, základní větve v období plodnosti takřka vodorovné
Výhony	kratší, velmi silné, téměř válcovité, boční výhony zakřivené, tvarově nepatrně kolénkovité, internodia krátká až velmi krátká, barva je načervenalé hnědá, z velké části jsou výhony ojíněné, takže působí dojem hnědošedé barvy, vrchol výhonu je hustě ochmýřený, ostatní část výhonu až sametově ojíněná, lenticely kulaté, na báze velké, husté, v ostatní části středně husté a protáhlejší
Pupeny	pupeny jsou velké, oblé, mírně odstávající, světle šedě ochmýřené, patka krátká, široká, žebra ostrá, krátká, květní pupeny velké, zakulacené, tupě zašpičatělé, šupiny načervenalé, šedě ochmýřené
Listy	velké až velmi velké, okrouhle eliptické, tupěji zašpičatělé, tvarově vyrovnané, symetrické, tmavě zelené, mdle lesklé, naspodu značně ochmýřené
Květy	středně velké, velmi nepravidelné, různě zprohýbané, vypadají jako povadlé, korunní plátky jsou špinavě nazelenalé, žlutobílé s mírným

	hnědavě růžovým nádechem, široce eliptické, nepravidelně zvlněné, okraje nerovné, vzájemně se dotýkající; dobrý opylovač, vhodnými opylovači jsou 'James Grieve', 'Coxova reneta', 'Ontario', 'Parména zlatá zimní', 'Průsvitné letní' a 'Wagenerovo'
Opylovací poměry	Cizosprašná
Plody	kulovité až tupě kuželovitý, žebematé s 5 nepravidelnými plochými žebry, zřetelnými až do stopečné části plodu (jsou nepravidelně zaoblená), nesouměrné, dosti vyrovnané, střední až velké, slupka polodrsná, suchá, později mastná až velmi mastná, často nepříjemně voskově lepkavá, základní barva nažloutle zelená, krycí oranžově červená, tečkovaná až mramorovaná, dužnina žlutozelená, zrnitá, hrubší, šťavnatá, sladce nakyslá, dobrá
Možnost záměny taxonu (+..	Habitus koruny, charakteristicky kulovitá koruna, silné, téměř válcovité výhony, plstnaté listy, charakteristické květy, vybarvení a tvar plodů (zejména v kališní části).

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka středně raná, kvete dlouho

Doba zrání

Doba zrání - poznámka počátek října až polovina října (skladovatelnost do března)

Nároky na stanoviště

Faktor tepla náročná na klima, nejlépe podhorské oblasti s dostatkem slunečního svitu, značně mrazuodolná

Faktor půdy málo náročná na půdní podmínky, vyhovují jí hlinité úrodné půdy

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení vhodné všechny tvary, včetně polokmenů, čtvrtkmeny na M11, A2 a na semenáčích, zákrsy na M1 a M2, vřetenovitý zákrs na M4 a M2, velmi vhodná také do přísně tvarovaných ovocných stěn palmet

Řez vyhovuje hlubší řez

Podnož M11, A2, M1, M2, M4

Užitné vlastnosti

Choroby a škůdci trpí silně strupovitostí, středně padlím

Růstové i jiné druhově spec.. v mládí bujný, později v plné plodnosti slabý až nakonec se růst téměř zastaví, obrůstá velmi dobře krátkým plodonosným dřevem,

	na letorostech tvoří velmi často předčasný obrost, ve školce roste rovněž a dosti silně
Plodnost	velmi raná, vysoká (jedna z nejplodnějších odrůd u nás), vytváří velké shluky

Množení

Množení	Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování - Kopulace
---------	--

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad \(Výsadba jabloní\)](#)

Ostatní

Poznámka	Raný nástup do plodnosti, velká a téměř pravidelná plodnost, ideální tvorba obrostu, kompaktní růst s vhodnou reakcí na zmlazení a z toho vyplývající téměř univerzální vhodnost pro všechny tvary a typy výsadeb, odolnost proti mrazům.
Odkazy	• Nedostatky: Především nižší kvalita plodů, dále vyšší % horších a málo kvalitních plodů u starších stromů, mastná slupka

Grafické přílohy

