

# Taxon *Malus domestica* 'Zuccalmaglio reneta'

Název taxonu	<i>Malus domestica</i> 'Zuccalmaglio reneta'
Vědecký název taxonu	<i>Malus pumila</i> var. <i>domestica</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">Borkh.</a>
Odrůda	'Zuccalmaglio reneta'
Český název	jabloň obecná
Synonyma (zahradnický pou..	Reinette de Zuccalmaglio', 'Malus von Zuccalmaglios Renette', 'Zuccalmaglio'
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Odrůda</a>
Nadřazená kategorie	<a href="#">Malus</a>

## Biogeografické regiony

---

Biogeografické regiony - po.. Německo, Grevenbroich v Porýní 1878, Dietrich Ulhorn

## Zařazení

---

Fytocenologický původ kříženec 'Ananasova reneta' x 'Purpurové agátové'  
Pěstitelská skupina Jádrovina

## Popisné a identifikační znaky

---

**Habit us** koruny jsou zpočátku širší, jehlancovité, později vysoce kulovité, pravidelné, hustší, větve jsou nasazeny v ostrém úhlu

**Výhony** středně dlouhé, u mladých stromů jsou silné, u starších stromů slabé, tvarově mírně kolénkovité, internodia kratší, nestejnoměrná, barva je tmavěji hnědá, ve stínu nazelenale hnědá, vrcholek je silně ochmýřený, ostatní část stříbřitě ožíněná, lenticely jsou drobné, velmi řídké, světlé, málo nápadné

**Pupeny** pupeny jsou malé, přisedlé, značně plstnaté, sedící na malých, nižších patkách, s žebry jen naznačenými, květní pupeny středně velké, kuželovité, přišpičatělé, šupiny červenavě žilkované, ke špičce značně plstnaté

**Listy** malé, drobné, vejčité až protáhle eliptické, asymetrické, zelené, málo lesklé, rub nepatrně ochmýřený, okraj čepele nepravidelně jednoduše i dvojitě pilovitý

**Květy** středně velké, široce miskovité, korunní plátky jemně narůžovělé, eliptické, miskovitě prohnuté, okraje málo zvlňené, vzájemně se mírně překrývající, blizny mírně přesahují úroveň prašníků; dobrý opylovač, vhodnými opylovači jsou 'Baumannova reneta',

´Berlepschova reneta´, ´Boikovo´, ´Coxova reneta´, ´James Grieve´, ´Landsberská reneta´, ´Oldenburgovo´, ´Parména zlatá´

Opylovací poměry

Cizosprašná

Plody

velmi proměnlivé, vysoce kulovité až vejcovité, menší až středně velké, slupka hladká, pololesklá, mírně mastná a pevná, základní barva citrónově žlutá, dužnina žlutavá, křehká

Možnost záměny taxonu (+..

Habitus koruny, drobnější listy se zvlněným okrajem, tvar a zejména vybarvení plodů s nápadnými lenticelami, které jsou u velkých plodů ohraničeny červenými dvůrkami.

## Doba kvetení

---

Doba kvetení - poznámka

středně raná

## Doba zrání

---

Doba zrání - poznámka

polovina října (skladovatelnost do března)

## Nároky na stanoviště

---

Faktor tepla

proti mrazům je ve dřevě málo odolná a byly pozorovány poškození v každé tvrdší zimě

Faktor půdy

nesnáší suché a přehnojené půdy

## Agrotechnické vlastnosti a požadavky

---

Vhodnost vedení

vhodná jen pro nízkokmeny; čtvrtkmeny na semenáči nebo A2 a M 11, zákrsky na M 1, 2 a 4, větvenovité zákrsky na M 4 a 2, jen výjimečně jako doplněk v sadech na M 9, pro ovocné stěny se nehodí

## Užitné vlastnosti

---

Choroby a škůdci

proti strupovitosti a padlí jen středně odolná, na vlhkých místech stromy trpí rakovinou

Růstové i jiné druhově spec..

v mládí střední, ale velmi brzy ustává, až je později velmi slabý a je nutné jej podporovat, po zakrácení dosti dobře obrůstá ponejvíce delším plodonosným obrostem

Plodnost

raná, zpočátku pravidelná, později má však tendenci ke střídavé plodnosti, celkově je velmi úrodná

## Množení

---

Množení

Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování -

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad \(Výsadba jabloní\)](#)

## Ostatní

---

Poznámka Vyniká úrodností, ostatní vlastnosti jsou jen průměrné a neodpovídají požadavkům na tržní odrůdu. Vysoké nároky na půdu a agrotechniku, drobné plody, malá mrazuvzdornost, jen průměrná odolnost proti chorobám, málo vyhovující vzhled.

## Grafické přílohy

---

