

# Taxon *Ficus pumila*

Název taxonu	<i>Ficus pumila</i>
Vědecký název taxonu	<i>Ficus pumila</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">Linn.</a>
Odrůda	´Rikke´
Český název	fíkovník odívající
Synonyma (zahradnický pou..	<i>Ficus stipulata</i> Thunb., <i>Ficus vestita</i> Desf.
Autor	Jiří Uher (ji_uher@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Odrůda</a>
Vnitrodruhové jednotky	var. <i>pumila</i>
Nadřazená kategorie	<a href="#">Ficus</a>

## Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Paleotropická květenná říše a Indočínská oblast
Biogeografické regiony - po..	po celé jižní Číně z Yunnanu po Jiangsu a Taiwan, Vietnam, Ryukyu

## Zařazení

Fytcenologický původ	aifyllofyt (petrofyt, xylofyt) - tropické deštné a tropické monzunové lesy, na skalách a kmenech stromů, starých zdech do 2200 m n.m.
Pěstitelská skupina	Liána a Interiérová rostlina okrasná listem
Životní forma	Fanerofyt

## Popisné a identifikační znaky

Habitus	liána nebo půdopokryvný plazivý keř (v hrnkách přepadavě rostoucí)
Kořen	adventivní kořeny po celé délce juvenilních výhonů
Výhony	juvenilní výhony tenké (1-2 mm), pnoucí, hnědavě plstnaté, dvouřadě olistěné, kořenující; adultní silné a samonosné
Listy	bathyfyly dvouřadě, vejčité, asymetrické, pergamenovité, zdéli palce; akrofyly robustní, až 0.1 m dl., kožovité, elipčité anebo vejčité, shora téměř lysé, vespod po nervatuře jemně pýřité a s cystolity
Květenství	soliterní, globosní nebo cylindrická (u var. <i>awkeotsang</i> ) receptakula (fíky) uzavírající květy, po uzrání temně purpurová, často až velikosti slepičího vejce
Květy	drobné s masitými, načervenalými, pýřitými tepaly - samčí (s 2-3 tyčinkami) a hálkové květy obvykle trojčetné, samičí až pětičetné

Opylovací poměry	Cizosprašná
Plody	okrouhlé lepkavé nažky
Semena	neoddělitelná od nažek
Možnost záměny taxonu (+..)	mnohotvárný taxon s dimorfními listy, v mládí však zaměnitelný stěží - dospělé rostliny zaměnitelné s některými druhy sekcí Rhizocladus (F. sarmentosa Sm., F.cinnamomea Corner - obě s hrotnatými listy) a Kissosycea (F. punctata Thunb., F. ruginervia Corner - s uniformními listy a velikými ozdobnými fíky, samčí květy s jedinou tyčinkou)
Dlouhověkost	dlouhověká

## Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	dlouhodobému nedostatku světla přizpůsobivá méně než jiné fíkusy; množení 16 klux, produkce 32-48 klux; k déleodobému uchování kvality u spotřebitele alespoň 2-4 klux
Faktor tepla	20°C-24°C množení (se spodním vytápěním), poté 18°C-24°C / 20°C létě (za vyšší RVV i optimum tepot vyšší), 16°C-18°C v zimě (do -2°C bez poškození, ale dlouhodobá zástava růstu)
Faktor vody	RVV: produkce 80% a více, v bytech a prodejních halách nejméně 60%; nízká vzdušná vlhkost dekompenzuje pozitivní vliv světla a za vysoké světelné intenzity dochází pak k poškození listů
Faktor půdy	především vzdušný a propustný substrát (hemiepifyt!); produkce zpravidla v baltské rašelině s pH5.5-6.5; citlivá na nedostatek vápníku
Faktor půdy - vápnomilný	✓

## Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického..	celoročně
Choroby a škůdci	rzi (Physopella, Cerotelium) a početné deuteromycety (Colletotrichum, Macrophoma, Diplodia, Septoria, Glomerella, Cercospora, Pellicularia, Corynespora); ze škůdců svilušky (Eotetranychus, Aceria), červci (Planococcus, Ceroplastes, Paratachardina), třásněnky (Gynaikotrips), molice (Singhiella, Paraleyrodes), bejlomorky (Horidiplosis), háďátka rodů Pratylenchus a Aphelenchoides
Doporučený spon pro výsad..	produkce v 8-9 cm hrnkách: 4-6 týdnů 140 /m <sup>2</sup> , dalších 4-6 týdnů 80 /m <sup>2</sup> ; vysazování v zimních zahradách dle kultivaru 6-18 rostlin na m <sup>2</sup>

## Množení

---

Množení	Řízkování, Vrcholové řízky, Osní řízky a „in vitro“ (mikropropagace)
Množení - poznámka	vrcholové i osní řízky s 8-10 listy po pěti nebo více (drobnolisté odrůdy!) do 6 cm hrnků - osní řízky prorážejí jen o málo později než vrcholové
Mezihrnky	multipack nebo hrnky 6 cm
Konečné hrnky	hrnky 8-10 cm (80 rostlin na m <sup>2</sup> ) nebo více v závislosti na velikosti expedovaných rostlin
Retardace	ne
Doba kultivace	v 8-9 cm hrnkách v létě osm týdnů, v zimě do 12 týdnů (menší rostliny s výhony o 15-20 listech); vyvazované v 14 cm hrnkách 30-38 týdnů
Odrůdy	několik drobnolistých odrůd lišících se různou pokryvností variegace: 'Sunny', 'Rikke', 'Dort he', 'Arina', 'Bellus', 'Curly' a další

## Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF

- [Park - Palmový skleník / Zámecký park v Lednici](#)
- [S 1: přední pravá loď... / ZF - S - Experimentální zahrada - skleník](#)

## Ostatní

---

Odkazy

- Stahn B.& al. (1987): Grünpflanzen in Tabellen und Übersichten. VEB Deutscher Landwirtschaftsverlag, Berlin;
- Berg C.C.& Corner E.J.H (2005): Flora Malesiana vol.17-2 Moraceae- Ficus, Nat.Herb.Nederland, Leiden;
- Meggelen-Langland I. (1992): Ficus. Deutscher

## Grafické přílohy

---





