

Taxon *Potentilla fruticosa*

Název taxonu	Potentilla fruticosa
Vědecký název taxonu	Potentilla fruticosa
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Odrůda	´Jolina´
Český název	mochna křovitá
Synonyma (zahradnický pou..	Dasiphora fruticosa (L.) Rydb.
Autor	Miloš Pejchal (milo_pejchal@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Potentilla

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Cirkumboreální oblast, oblast Skalistých hor (severozápad SA), oblast Sierra Madre (jihozápad SA), Severoamerická atlantická oblast (východ SA), Atlanticko-eurosibiřská oblast, Mediterránní oblast a Iránsko-turanská oblast
Biogeografické regiony - po..	severní polokoule s výjimkou větší části východní Asie, v Evropě velmi řídké, spíše ostrůvkovitě

Zařazení

Pěstitelská skupina	Listnatý keř opadavý
Životní forma	Fanerofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	vzpřímený, široce rozložitý keř 20-150 cm vysoký
Výhony	letorosty obvykle zprvu chlupaté
Pupeny	střídavé
Listy	listy 3-7četné, jednotlivé lístky přisedlé, vejčité až podlouhle kopinaté nebo vejčitě kopinaté, 3-25 mm
Květy	květy 15-30 mm široké, po 1 až několika na vrcholcích větví, korunní lístky asi 8-15 mm, líc zlatožlutý, rub matně žlutý, tyčinek 12-25
Plody	nažky
Kůra a borka	kůra hnědočervená až hnědá

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Srpen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - polostín	✓
Faktor světla - poznámka	světlomilná
Faktor tepla	oblast I-III
Faktor vody	suchovzdorná
Faktor půdy	na půdu nenáročná

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	V-VIII - květ
Použití	dřevina pokryvná, do popředí keřových skupin

Množení

Množení	Předpěstování sadby, Řízkování, Bylinné řízky a Polovyztřelé řízky
Množení - poznámka	semenem můžeme množit základní druh, kultivary úspěšně množíme řízkováním (zelenými nebo polovyztřelými řízky)
Odrůdy	mnoho kultivarů různých velikostí a barvy květů