

Taxon Tanacetum coccineum

Název taxonu	Tanacetum coccineum
Vědecký název taxonu	Tanacetum coccineum
Jména autorů, kteří taxon p...	(Willd.) Grierson
Český název	řimbaba šarlatová, kopretina šarlatová
Synonyma (zahradnický pou..	Pyrethrum coccineum Tzvelev; Pyrethrum roseum Tzvelev
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Asteraceae

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holarktická květenná říše
------------------------	---------------------------

Zařazení

Fytocenologický původ	kamenité vysokohorské louky a pastviny, mezi 1500–3000 m n. m.
Pěstitelská skupina	Trvalka zatahující
Životní forma	Hemikryptofyt

Popisné a identifikační znaky

Habitus	trsnatá vytrvala bylina dorůstající výšky 20–100 cm, typem a tvarem květenství připomínající domácí kopretinu. Od ní se liší výraznými barvami (převládají růžové a fialové) a zpeřeným listem
Kořen	tenký vyrůstající z dlouhého plazivého oddenku
Výhony	lodyha přímá až vystoupavá, po celé délce olistěná, příležitostně rozvětvená, většinou lysá
Listy	jemně dělené, světle zelené, připomínající kapradiny, uspořádané v přízemní růžici a podél stonku
Květenství	úbory v průměru 5–8 cm velké
Květy	jazykovité květy v odstínech růžová, fialová, vzácně i bílý, žluté trubkovité květy v terči
Plody	nažka
Vytrvalost	spolehlivě mrazuvzdorná
Dlouhověkost	krátkověká (potřeba každých 3–4 roky přesadit a rozdělit)
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Duben
Konec doby kvetení	Květen
Remontování	✓

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor vody	přiměřeně vlhká, ne extrémní sucho
Faktor půdy	živné, zahradní, propustné

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	v době kvetení
Použití - pro trvalky	VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPP - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru a Z - Záhon
Použití	také k řezu a jako hrmková rostlina

Množení

Odrůdy	liší se především: a) barvou květu: Rů ('Brenda', 'Robinson's Rosa', 'Robinson's Pink', 'Duro', 'Eileen May Robinson'), F ('Rosabella'), Č ('Robinson's Red', 'James Kelway'), B ('Mont Blanc', 'Queen Alexandra'). b) stavbou květu: převládají s jednoduchým květem, několik málo s květem plným – např. 'Alfred' (Rů), 'Mont Blanc' (B) c) výškou: nižší, kompaktního růstu do cca 60 cm (např. 'Alfred') vyšší, volného růstu – cca od 60–90 cm (např. série Robinson)
--------	--

Grafické přílohy



