

# Taxon *Vitis vinifera* Bronner

Název taxonu	<i>Vitis vinifera</i> Bronner
Vědecký název taxonu	<i>Vitis vinifera</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">Linné</a>
Odrůda	´Bronner´ (Br)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	FR 250-75
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Odrůda</a>
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	<a href="#">Vitis</a>

## Biogeografické regiony

---

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	jde o německou odrůdu, vznikla křížením ´Merzling´ x (´Saperavi severnyj´ x ´Svatovavřínecké´)

## Zařazení

---

Fytcenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Mošťová odrůda
Životní forma	Fanerofyt

## Popisné a identifikační znaky

---

Habitus	dle vedení, má středně bujný až bujný růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné, kaštanově hnědé, dobře vyzrávající
Pupeny	větší, tupé
Listy	středně velké, pětilaločnaté s výraznými výkroji, bazální výkroj je lyrovitý, nejčastěji uzavřený; povrch listu je vrásčitý, vespod lehce plstnatý
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	středně velký až velký hrozen, kuželovitý, hustý; bobule je malá, kulatá, žlutozelená s hnědými tečkami
Semena	malá až středně velká, hruškovitá, s krátkým zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano

Doba rašení Na jaře rašící (IV)

## Doba kvetení

---

Začátek doby kvetení Květen

Konec doby kvetení Květen

## Doba zrání

---

Začátek doby zrání Zář

Konec doby zrání Říjen

## Nároky na stanoviště

---

Faktor světla - slunce ✓

Faktor světla - poznámka vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)

Faktor tepla teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost střední až nižší

Faktor vody méně vhodné jsou příliš suché půdy

Faktor půdy nejlépe hlinitopísčité humóznější půdy

Faktor půdy - vápnomilný ✓

Faktor půdy - poznámka ovlivňujeme podnoží

## Agrotechnické vlastnosti a požadavky

---

Vhodnost vedení střední i vysoké vedení

Řez na tažně

Podnož pro vyšší tvary do sušších podmínek bujněji rostoucí podnože Kober 125 AA i 5 BB; do hlubších humóznějších půd SO 4, Binova i CR 2

## Užitné vlastnosti

---

Použití bílá moštová odrůda - výroba bílého vína, přímý konzum

Choroby a škůdci vyšší odolnost k houbovým chorobám

Plodnost spíše pozdní, pravidelná (výnos 9-15 t/ha)

## Množení

---

Množení Roubování

Množení - poznámka dá se množit i hřížením, dřevitými řízkami i mikropropagací

Popis vína víno je podobné Rulandskému bílému

Doporučená technologie vína jakostní i přívlastková vína

## Celky sbírek

---

- [V / ZF - V - vinice \(řádek 94\)](#)

## Grafické přílohy

---

