

Taxon *Prunus armeniaca* 'Marlen'

Název taxonu	<i>Prunus armeniaca</i> 'Marlen'
Vědecký název taxonu	<i>Prunus armeniaca</i>
Jména autorů, kteří taxon p...	L.
Odrůda	'Marlen'
Český název	meruňka obecná
Autor	Klára Gogolková (kl_ra_gogolkov_@unknown.cz)
Kategorie	Odrůda
Nadřazená kategorie	Prunus

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony - po.. Česká republika

Zařazení

Fytopcenologický původ klon odrůdy 'Velkopavlovická'
Pěstitelská skupina Peckovina

Popisné a identifikační znaky

Habitus koruna kulovitě rozložená
Květy stejně velké jako 'Velkopavlovická', okrouhlé, bílé s jemným růžovým žilkováním, blizna v úrovni prašníků
Plody středně velké (40-55 g), srdčité, slupka slabě hrboľkovitá, dužnina oranžová, pevná, v konzumní zralosti rozplývavá, šťavnatá, dobrá odlučitelnost, chuť sladce navinulá, aromatická, velmi dobrá

Doba kvetení

Doba kvetení - poznámka střední

Doba zrání

Doba zrání - poznámka středně raná, 2. pol. července, 3 dny před 'Velkopavlovická'

Nároky na stanoviště

Faktor tepla středně silně odolná vůči mrazu v květu, poměrně náročná na polohu
Faktor půdy nejlépe půdy zásobené živinami a vláhou

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Vhodnost vedení	vhodný zákrsek, špičák s předčasným obrostem, čtvrtkmen
Řez	nenáročná na řez
Podnož	vhodný myrobalán, zelená renklóda, dle podmínek stanoviště

Užitné vlastnosti

Použití	přímý konzum, konzervárenství
Choroby a škůdci	citlivá k šarce, proti houbovým chorobám středně odolná, citlivá ke gnomonii
Růstové i jiné druhově spec..	bujný růst
Plodnost	velká a pravidelná

Množení

Množení	Očkování, Očkování - Na spící očko, Roubování a Roubování - Kopulace
---------	----------------------------------------------------------------------

Celky sbírek

Celky sbírek v areálu ZF

- [OS 1: chladírna / ZF - OS - Ovocný sad \(Genofond meruněk\)](#)

Ostatní

Poznámka	Jedná se o odrůdu velmi blízkou k 'Velkopavlovická'. Genetická příbuznost s 'Velkopavlovická' nebyla zatím prověřována. Roste bujně, tvoří kulovitě rozložené koruny. Má výrazný sklon k bazipetální plodnosti a zvýšenou schopnost udržet plodný obrost uvnitř koruny. V podmínkách Lednice projevila vyšší adaptabilitu k rozdílným klimatickým podmínkám jednotlivých let a vyšší a pravidelnější plodnost. Od původní odrůdy 'Velkopavlovická' se liší dobou kvetení - kvete postupně a o 1-2 dny později. Morfologické a kvalitativní znaky plodu jsou prakticky shodné se standardní odrůdou 'Velkopavlovická'.
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Grafické přílohy

