

Taxon *Cerastium tomentosum*

Název taxonu	Cerastium tomentosum
Vědecký název taxonu	Cerastium tomentosum
Jména autorů, kteří taxon p...	DC.
Český název	rožec plstnatý
Autor	Tatiana Kuřková (tatiana_ku_kov_@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Cerastium

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Holartická květenná říše
Biogeografické regiony - po..	pohoří Itálie

Zařazení

Pěstitelská skupina	Trvalka polostálozelená
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Di - divoce rostoucí trvalka

Popisné a identifikační znaky

Habitus	vitální, stříbřitě šedá bylina, tvořící husté koberce; původní druh vysoký až kolem 40 cm, nízká forma pěstovaná pod názvem var. columnae vysoká pouze 10 - 15 cm v květu
Kořen	jemný
Výhony	lodyhy niťovité, vystoupavé, kolénkaté, při kontaktu se substrátem zakořeňující
Listy	vstřícný, lineární, hustě stříbřitě plstnatý, přisedlý,
Květenství	mnohačetné vidlany
Květy	oboupohlavné, pravidelné, nálevkovité, 10–20 mm v průměru. Kalich pětičetný, kališní lístky 5-7 mm, plstnaté, korunní lístky křídově bílé, na špičce s výrazným lalokem, 2x tak dlouhé jako kališní, čnělek 5.
Plody	nažka
Možnost záměny taxonu (+..	podobný s často pěstovaným <i>Cerastium biebersteinii</i> , který je větší ve všech svých částech a vitálnější
Vytrvalost	vytrvalá
Doba rašení	Brzy na jaře rašící (II-III)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červenec
Doba kvetení - poznámka	v době květu záplava květů zcela překryje listy
Remontování - poznámka	ojediněle

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	rostliny pěstované v polostínu jsou slabé, vytáhlé, méně stříbřité a hůře kvetou
Faktor tepla	u nás zcela mrazuvzdorný
Faktor vody	sucho
Faktor půdy	propustné, písčité, kamenité půdy
Faktor půdy - poznámka	nemá vyhraněné pH

Agrotechnické vlastnosti a požadavky

Řez řezem lze na jaře přestárlé porosty zmladit, dobře obráží

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetickéh..	v době kvetení; listem atraktivní celý rok
Použití - pro trvalky	VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPP - Volné plochy přírodě blízkého charakteru, VPz - Volné plochy záhonového charakteru a VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca)
Použití - pro trvalky - pozná..	hluboké živné půdy záhonu mu nesvědčí - může vyhnívat; jinak velmi nenáročná, snadno pěstitelná trvalka
Použití	různé stylizované výsadby s použitím minerálního substrátu - šterkové záhony, spáry v dlažbě a ve schodech, suché zídky, mezi šlapáky, okraje nádob
Růstové i jiné druhově spec..	není tak vitální a rozrůstavý jako C. biebersteinii
Doporučený spon pro výsad..	7 - 9 ks/m ²

Množení

Množení Předpěstování sadby, Bylinné řízky, Dělení trsů a Množení oddělky