

# Taxon *Vitis vinifera* Negra

Název taxonu	Vitis vinifera Negra
Vědecký název taxonu	Vitis vinifera
Jména autorů, kteří taxon p...	<a href="#">Linné</a>
Odrůda	´Negra´ (Neg)
Český název	Réva vinná pravá
Synonyma (zahradnický pou..	AACA 6/9
Autor	Radek Sotolář (radek_sotol_@unknown.cz)
Kategorie	<a href="#">Odrůda</a>
Vnitrodruhové jednotky	vinifera
Nadřazená kategorie	<a href="#">Vitis</a>

## Biogeografické regiony

---

Biogeografické regiony	Kulturní původ
Biogeografické regiony - po..	jde o slovenskou odrůdu, vznikla křížením odrůd ´Aptiš Aga´ x ´Cardinal´

## Zařazení

---

Fytcenologický původ	původní odrůda
Pěstitelská skupina	Liána opadavá
Pěstitelská skupina - pozná..	stolní odrůda révy
Životní forma	Fanerofyt

## Popisné a identifikační znaky

---

Habitus	má středně bujný růst
Výhony	jednoleté réví je středně silné až silné, žluto hnědé, dobře vyzrávajících
Pupeny	středně velké, širší, zašpičatělé
Listy	středně velké, pěti i vícelaločnatý, středně až hluboce vykrajované, řapíkový výkrojek je lyrovitý, otevřený; povrch listu je jemně vrásčitý
Květenství	lata
Květy	oboupohlavné, pětičetné
Opylovací poměry	Samosprašná
Plody	středně velký, kuželovitý, středně hustý hrozen; bobule je velmi velká, vejcovitá, se špičatým vrcholem, modročerné barvy
Semena	velká, s delším zobáčkem
Kůra a borka	šedé barvy, odlupuje se v pásech
Vytrvalost	ano
Dlouhověkost	ano
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

## Doba kvetení

---

Začátek doby kvetení	Květen
Konec doby kvetení	Červen

### Doba zrání

---

Začátek doby zrání	Září
Konec doby zrání	Září

### Nároky na stanoviště

---

Faktor světla - slunce	✓
Faktor světla - poznámka	vyžaduje kvalitní oslunění (mírné svahy s jižní expozicí)
Faktor tepla	teplé polohy (kukuřičná oblast), mrazuvzdornost dobrá
Faktor vody	příliš suché písčité půdy jsou méně vhodné
Faktor půdy	hlinité či hlinitopísčité půdy
Faktor půdy - vápnomilný	✓
Faktor půdy - poznámka	ovlivňujeme podnoží

### Agrotechnické vlastnosti a požadavky

---

Vhodnost vedení	střední i vysoké vedení
Řez	na dlouhý tažeň
Podnož	na chudších půdách Kober 125 AA či 5 BB, do hlubších a úrodnějších půd pak CR 2, SO 4 či T 5C

### Užitné vlastnosti

---

Použití	stolní odrůda - přímý konzum
Choroby a škůdci	středně odolná k houbovým chorobám, citlivá k plísni šedé a mrazům
Plodnost	středně pozdní, pravidelná (výnos 5-9 t/ha)

### Množení

---

Množení	Roubování
Množení - poznámka	dá se množit i hřížením, dřevitými řízkami i mikropropagací
Popis vína	dužnina bobule je masitá, chuť neutrální až jemně muškátové

### Celky sbírek

---

Celky sbírek v areálu ZF	<ul style="list-style-type: none"><li><a href="#">V / ZF - V - vinice (řádek 129)</a></li></ul>
--------------------------	---

### Ostatní

---

Odkazy	<ul style="list-style-type: none"><li><a href="http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf">http://tilia.zf.mendelu.cz/ustavy/556/ustav_556/atlas_reva/atlas_reva.pdf</a></li></ul>
--------	---

### Grafické přílohy

---

