

Taxon *Echinops ritro*

Název taxonu	Echinops ritro
Vědecký název taxonu	Echinops ritro
Jména autorů, kteří taxon p...	Linné
Český název	bělotm modrý
Synonyma (zahradnický pou..	Echinops tauricus
Autor	Pavol Kaššák (pavol_ka_k@unknown.cz)
Kategorie	Druh
Nadřazená kategorie	Echinops

Biogeografické regiony

Biogeografické regiony	Mediterránní oblast
Biogeografické regiony - po..	Středozeví, Španělsko, Francie

Zařazení

Fytcenologický původ	výslunné kamenité a skalnaté stráně, trávniky na okrajích vinic nebo komunikací, zejména na vápencovém podkladě, v pásnu od mořského pobřeží po 1500 m n. m.
Pěst itelská skupina	Trvalka zatahující
Životní forma	Hemikryptofyt
Zařazení podle původu, nár...	Diza - divoce rostoucí trvalka záhonového charakteru

Popisné a identifikační znaky

Habitus	vzpřímeně rostoucí trsy, v zahradnické praxi dosahující výšky 80 - 120 cm,
Kořen	větvený, vřetenovitý až kulovitý kořen - špatné přesazování
Výhony	přímé, řídce větvené, oblé, drsně chlupaté, stříbřité
Listy	přízemní dlouze řapíkaté, vytvářející listovou růžici, peřenosečné nebo peřenoklané. Lodyžní v obrysu kopinaté, střídavé, 10 - 20 cm dlouhé, jednou až dvakrát peřenoklané v ostnitě úkrojky, na rubu běloplstnaté
Květenství	strbouly (někdy označované jako hlávky) 4 - 8 cm v průměru
Květy	jednokvěté úbory dlouhé asi 2 cm, modré barvy. Trubkovitá koruna oboupohlavných květů je složena z pěti srostlých, modrých plátků
Plody	souplodí nažek.
Možnost záměny taxonu (+..	těžko rozlišitelná od <i>E. banaticus</i> ; na území ČR jako invazivní druh se šíří <i>E. sphaerocephalus</i> se špinavě bílými úbory
Vytrvalost	spolehlivě mrazuvzdorná

Dlouhověkost	středněvěká
Doba rašení	Na jaře rašící (IV)

Doba kvetení

Začátek doby kvetení	Červenec
Konec doby kvetení	Srpen

Nároky na stanoviště

Faktor světla - slunce	✓
Faktor tepla	teplomilná trvalka
Faktor vody	suchomilná
Faktor půdy	na půdu nenáročná, vyžaduje půdy propustné, teplé,
Faktor půdy - vápnomilný	✓

Užitné vlastnosti

Období hlavního estetického...	v době kvetení
Použití - pro trvalky	VP - Volné plochy (otevřené, slunné, bez souvislého porostu dřevin), VPs - Volné plochy stepního charakteru (živné půdy s vysokým obsahem Ca), KSss - Kamenitá stanoviště - skalnatá step (štěrk, suť, skalnatý záhon) a Z - Záhon
Použití	nenáročný taxon se zajímavou strukturou
Růstové i jiné druhově spec..	trvalky medonosná, komerčně pěstovaná k řezu, také k sušení
Doporučený spon pro výsad..	3 - 5 ks/m ²

Množení

Množení	Generativní a Množení oddělky
Odrůdy	'Veitch's Blue' - intenzivněji vybarvená než původní druh

Ostatní

Výsev/výsadba na stanoviš...	2006
------------------------------	------

Grafické přílohy

